

بیمار عزیز:

برای انجام دیالیز خونی شما و خروج سموم از بدنتان نیاز به جریان خونی مناسب برای دستگاه دیالیز داریم و تا زمانی که بتوان از فیستول شما استفاده نمود. به این منظور می بایست بطور موقت از یک کاتتر یا لوله دو شاخه ای که در یک سیاهرگ بزرگ مانند ورید ساب کلوین یا ژیگولار در گردن گذارده می شود جهت دیالیز استفاده نماییم. لذا جهت پیشگیری از عوارضی مانند عفونت، خونریزی یا خارج شدن این کاتتر نیاز به همکاری شما در رعایت موارد ذیل داریم:

- محل کاتتر حتی الامکان هفته ای سه بار پانسمان شود.

- در صورت داشتن کاتتر دائم، تعویض پانسمان باید تا مدت ۸-۶ هفته انجام گیرد و پس از آن نیازی به وجود پانسمان نمی باشد.
- به هنگام حمام کردن روی پانسمان و لوله ها را با پلاستیک پوشانده و بعد سر بدن را جداگانه بشویید. (مراقب باشید محل ورود لوله ها در گردن خیس نشود).
- در صورت داشتن کاتتر دائم پس از ۸ هفته می توانید براحتی حمام کنید و بهتر است پس از حمام، محل کاتتر دائم را با سشوار خشک کنید.

- در صورت بروز هرگونه تحریک و خارش در محل بخیه ها، به هیچ عنوان به آن دست نزنید.
- مراقب تاشدگی و یا خمیدگی لوله ها باشید و با آنها بازی نکنید و سرپوش لوله ها را باز نکنید.
- از ورود ضربه و یا ایجاد کشش بر روی لوله ها جلوگیری نمائید.
- با استفاده از ثابت کننده های لوله های کاتتر مانند सर्جی فیکس روی پانسمان گردن، از حرکت های بی مورد لوله ها جلوگیری نمائید.
- در صورت احساس درد شدید در محل لوله ها و یا در قفسه سینه فوراً به پزشک مراجعه نمائید.




مراقبت از کاتتر دوجداره داخل گردن (شالدون)

تیرماه ۱۳۹۳

زیر نظر واحد آموزش

باآرزوی سلامتی برای شما مددجوی گرامی



- در صورت باز شدن بخیه ها و یا جا به جایی لوله ها قبل از اقدام به هر کاری ، فوراً به پزشک مربوطه مراجعه نمایید.
- در صورت بروز تب و لرز حتماً پزشک خود را مطلع کنید.
- کلامپ قطع جریان خون که در هر دو شاخک لوله ها است به هیچ عنوان باز و بسته نگردد.
- به پیچ های سر لوله ها دست نزنید.
- در صورت مشاهده قرمزی، التهاب، خونریزی و ترشح زرد رنگ چرکی، سریع به پزشک مراجعه کنید.
- هنگام باز نمودن سر کاتترها توسط پرستار حین دیالیز، حتماً جهت پیشگیری از انتقال عفونت از ماسک استفاده نمایید.