




نارسایی قلبی



(آموزش بیماران)

واحد آموزش

۱۳۹۳

اضطراب و استرس بر عملکرد قلب شما تاثیر می گذارد. بنابر این از مواجهه و انجام فعالیت های استرس را خودداری کنید.



برای کاهش اضطراب و استرس، تکنیک های تنفس عمیق، پرت کردن حواس، گوش کردن موسیقی و ... را به کار بگیرید.



اگر عالیمی شامل؛ بی اشتهايی، افزایش وزن به میزان ۲/۵ کیلوگرم در عرض یک هفته، تنگی نفس در حین فعالیت، سرفه مداوم، شب ادراری، ورم پاها و شکم را مشاهده کردید، به پزشک خود اطلاع دهید.

از مصرف خود سرانه داروها، به خصوص داروهای آرامبخش، خودداری کنید.

دارودرمانی

دیگوکسین:

قبل از مصرف این دارو، نبض خود را کنترل کنید، اگر کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دارو را مصرف کنید و به پزشک خود اصلاح دهید.

اگر با مصرف دارو عالیم بی اشتهايی، گیچی، تهوع، استفراغ، خستگی و اختلالات بینایی را درخود دیدید، گزارش کنید.

فوروزماید (ادرار آور):

این دارو را در ابتدای صبح مصرف کنید.

اسپری ها:

در صورت داشتن احساس تنگی نفس از اسپری خود به اندازه ۲ پاف استفاده نمایید.

دیگر توصیه ها

از رفتن به محل های شلوغ و آلوده خودداری کنید.

وزن خود راهر روز در ساعت مشخصی (هر روز صبح بعد از ادرار کردن) کنترل کنید و افزایش وزن به میزان ۲/۵ کیلوگرم در مدت یک هفته گزارش کنید. مصرف مایعات خود را نیز کاهش دهید.

از خوردن مواد محرک مانند: قهوه، الکل، سیگار، و نوشابه خودداری کنید.

نمونه هایی از مواد غذایی بانمک پایین:

مرغ، ماهی، گوشت قرمز (که البته با خاطر چربی بالا بهتر است کمتر مصرف شود)



از انجام فعالیت های شدید یا استراحت طولانی در رختخوابتان پرهیزید.

برای حفظ انرژی فعالیت های خود را، بیشتر در بستر انجام دهید...

بعد از نارسایی قلب افسردگی بوجود می آید که اگر این عالیم را دارید به پزشک خود اطلاع دهید. افسردگی کیفیت زندگی شما را کاهش می دهد.

روزیم غذایی

از مصرف غذاهای نمک دار خودداری کنید. (در هنگام پختن و صرف غذا از افروزن نمک خودداری کنید.)

از مواد غذایی با نمک پایین، مانند: مرغ، ماهی، گوشت، برنج، سیب زمینی و ... استفاده کنید.

از مصرف غذاهای کنسرو شده، سوسیس، کالباس، و ... پرهیزید.

برای خوش طعم کردن غذا، از آبلیمو، آب غوره، گیاهان معطر، فلفل فرنگی و مرکبات استفاده کنید.

این پمفت شامل یک سری مراقبت ها و آموزش های پرستاری است که امیدواریم با رعایت آن از جانب شما و حمایت اطرافیانتان زندگی خوبی را داشته باشید.

اگر زود تر از موعد خسته می شوید و احساس تنگی نفس دارید یا پاهایتان متورم شده است نشانه نارسایی قلب است که با مصرف دارو اغلب بهبود می یابد. پس بهتر است به پزشک خود اطلاع دهید.

فعالیت

در طول روز استراحت کافی داشته باشید.

در هنگام استراحت جهت کم کردن تنگی نفس، سر تختنان را ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر بالا بیاورید.

جهت کم کردن ورم در پاهای، هنگام استراحت یا نشستن، پاهایتان را در سطح بالاتری قرار دهید.

اگر هنگام خوابیدن دچار تنگی تنفس می شوید، به مدت یک ساعت قبل از خواب، پاهایتان را در سطح بالاتری قرار دهید.

برای جلوگیری از سرگیجه، به آرامی تغییر وضعیت دهید.

از قرار گیری در هوای خیلی سرد یا گرم خودداری کنید، در هوای سرد روی بینی و دهان خود را بپوشانید.