

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط



دانشگاه علوم پزشکی قم

مرکز آموزشی درمانی کامکار - عرب نیا

## کتابچه ایمنی سلامت شغلی و بهداشت محیط

(( دیالیز ))



تهییه گنندگان

مهندس مریم صفربخشایش : کارشناس بهداشت حرفة ای

کیانا وفائی : کارشناس کنترل عفونت

مهندس اعظم السادات کبیری نیک : کارشناس بهداشت محیط

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## فهرست عناوین

### بهداشت حرفه ای

۱۲	بخش عمومی
۱۲	مقدمه
۱۲	تاریخچه بهداشت حرفه ای
۱۲	سازمان های بین المللی فعال در زمینه بهداشت حرفه ای
۱۳	سلامت شغلی(Occupational Health)
۱۳	هدف های سلامت شغلی
۱۳	محتوای بهداشت حرفه ای
۱۳	مهم ترین وظایف مهندسی بهداشت حرفه ای
۱۳	هدف های اصلی معاینه دوره ای
۱۴	بیماری ناشی از کار
۱۴	بیماری های مرتبط با کار
۱۴	سلامت محیط و کار در بیمارستان
۱۴	عوامل زیان آور محیط کار
۱۴	عوامل فیزیکی
۱۴	عوامل شیمیایی
۱۴	عوامل بیولوژیک
۱۴	عوامل ارگonomی
۱۴	عوامل روانی
۱۵	بخش اختصاصی
۱۵	خطرات بهداشتی واپیمنی
۱۶	عوامل زیان آور فیزیکی
۱۶	سر و صدا

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

۱۶	اثرات صدا بر انسان.....
۱۶	تهویه .....
۱۷	عوامل زیان آور شیمیایی.....
۱۷	تماس با پودر تالک در استفاده از دستکش لاتکس .....
۱۸	برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ( Material Safety Data sheet ) .....
۱۸	لوزی خطر .....
۲۰	تماس با ضد عفونی کننده ها .....
۲۰	الکل ۷۰ درصد .....
۲۱	پروکسان.....
۲۱	نانوسیل ( سورفامد ) .....
۲۲	تماس باشوینده ها .....
۲۲	واینکس .....
۲۲	توصیه های ایمنی جهت پیشگیری از حوادث ناشی از تماس با مواد شوینده .....
۲۳	عوامل زیان آور بیولوژیک .....
۲۳	راه های انتقال HBV در مراکز همو دیالیز .....
۲۴	جراحات و اتفاقات عمده .....
۲۵	عوامل زیان آور ارگونومیک .....
۲۵	کار نشسته یا ایستاده طولانی مدت .....
۲۵	واریس .....
۲۵	بلند کردن و جابجایی اجسام سنگین .....
۲۶	پوسچرهای نامناسب بدنی .....
۲۷	سندرم تونل کارپال ( از بیماریهای شایع و دردناک در ناحیه مج دست ) .....
۲۸	افتادن و لیز خوردن .....
۲۹	استرس .....

# **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

۲۹ .....	نوبت کاری
۳۰ .....	مخاطرات ایمنی
۳۰ .....	حریق
۳۱ .....	مثلث حریق
۳۱ .....	دسته بندی انواع حریق
۳۲ .....	مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها
۳۲ .....	نکات مهم در به کار گیری خاموش کننده های دستی
۳۳ .....	خاموش کننده های دستی
۳۴ .....	گازهای فشرده
۳۴ .....	احتیاط های عمومی برای نگهداری و استفاده از کپسولهای گاز فشرده
۳۵ .....	دستگاهها و تجهیزات نا ایمن
۳۵ .....	بریدگی ولاسیراسیون دست
۳۵ .....	نکات بهداشتی در بخش دیالیز
۳۵ .....	مسائل مربوط به محیط بخش دیالیز
۳۶ .....	مسایل مربوط به پرسنل بخش بخش دیالیز
۳۶ .....	سایر نکات مربوط ایمنی بهداشتی دیالیز
۳۶ .....	وسایل حفاظت فردی بخش دیالیز

## **کنترل عفووت**

۳۷ .....	عفونتهای بیمارستانی
۳۷ .....	چه علائمی ما را مشکوک به عفونت بیمارستانی می کند
۳۷ .....	عفونت ادراری
۳۸ .....	عفونت محل جراحی
۳۸ .....	پنومونی
۳۸ .....	عفونت خون

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

۳۸	تعريف عفونت
۳۸	کلونیزاسیون
۳۸	ناقل
۳۸	ایزو لاسیون یا جداسازی بیماران در بیمارستان
۳۸	احتیاطات استاندارد STANDARD PRECAUTIONS
۳۹	احتیاطات استاندارد
۳۹	بهداشت دست
۳۹	انتخاب وسائل حفاظت فردی بر اساس ارزیابی خطر
۳۹	دستکش
۳۹	ماسک
۳۹	گان
۳۹	حفاظت از چشم / محافظت صورت
۴۰	حفاظت از پاهای
۴۰	ترتیب پوشیدن وسائل حفاظت فردی
۴۰	ترتیب خارج کردن وسائل حفاظت فردی
۴۱	کاربرد مناسب تجهیزات مراقبت بیمار و کیسه های حاوی زباله
۴۱	پیشگیری از needle stick و جراحات پوستی
۴۱	نظافت صحیح محیط
۴۱	نحوه مواجهه صحیح با پسماندها
۴۱	احتیاط هایی بر اساس راه انتقال بیماری Transmission – Based Precautions
۴۱	احتیاط های هوایی Airborne precautions
۴۱	اصول احتیاط های هوایی
۴۲	احتیاط قطرات Droplet P.
۴۲	اصول رعایت احتیاط قطرات

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

۴۳	احتیاط تماسی Contact P
۴۳	اصول احتیاط های تماسی
۴۴	عفونت های که رعایت احتیاط برای انها بر اساس راه انتقال صورت می گیرد
۴۶	تشکیل پرونده بهداشتی و واکسیناسیون کارکنان بیمارستان
۴۶	سابقه واکسیناسیون
۴۶	واکسن هپاتیت ب B
۴۶	واکسن توام ( دیفتربی ، کزان )
۴۶	آنفلوآنزا
۴۶	منزهیت
۴۶	مواجهه شغلی
۴۶	تعریف مواجهه
۴۷	مایعات بالقوه عفونت زا
۴۷	کمک های اولیه فوری
۴۷	ارزیابی مواجهه
۴۷	دستورا لعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی
۴۷	موارد شستن دست با آب و صابون
۴۸	پنج موقعیت برای بهداشت دست
۴۹	پوشیدن دستکش
۴۹	مراحل انجام پاکسازی ، ضد عفونی و استریلیزاسیون
۴۹	نظافت یا پاکسازی Cleaning
۴۹	ضد عفونی Disinfection
۵۰	استریلیزاسیون Sterilization
۵۰	اهمیت پاکسازی قبل از استریلیزاسیون
۵۰	تقسیم بندی وسایل پزشکی از CDC

# **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

۵۰	ابزار و وسایل Critical یا بحرانی
۵۰	ابزار و وسایل نیمه بحرانی Semi Critical
۵۱	وسایل غیربحارانی No critical
۵۱	طبقه بندی کلی گندزدaha و مواد ضدغذوی
۵۲	تزریقات ایمن
۵۲	مقدمه
۵۲	انتقال ویروس های منتقله از راه خون
۵۳	خط مشی های پیشگیرانه
۵۴	بهترین روش ها در انجام تزریقات
۵۴	اصول ایمنی کلی در انجام تزریقات
۵۴	رعایت بهداشت دست
۵۴	راهنمای عملی برای رعایت بهداشت دست
۵۴	راهنمای عملی استفاده از دستکش
۵۵	راهنمای عملی در ضمن استفاده از وسایل حفاظت فردی
۵۵	راهنمای عملی برای ضدغذوی و آماده سازی پوست
۵۷	راهنمای عملی برای استفاده از وسایل تزریق
۵۷	أنواع ظروف دارویی و توصیه نحوه استفاده از آن ها
۵۷	راهنمای عملیاتی در دادن دارو به بیمار
۵۸	راهنمای عملیاتی برای آماده نمودن تزریقات
۵۹	ویال های دارویی سپتوم دار
۵۹	راهنمای عملیاتی برای تجویز تزریقات
۶۰	نکات مهم
۶۰	پیش گیری از ایجاد جراحت کارکنان بهداشتی درمانی با وسایل نوک تیز و برنده
۶۱	منابع

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## بهداشت محیط

۶۲	..... بهداشت محیط Environmental Health
۶۲	..... بهداشت محیط بیمارستان Environmental Health Hospital
۶۲	..... ضد عفونی کننده ها
۶۲	..... تعاریف و اصطلاحات
۶۲	..... دترجننت ( Detergent )
۶۲	..... شستشو یا نظافت ( Cleaning )
۶۳	..... گندزدایی یا ضد عفونی ( Disinfection )
۶۳	..... سترون سازی یا استریلیزاسیون ( Sterilization )
۶۳	..... تقسیم بندی پزشکی از سوی مرکز پیش گیری و کنترل بیماری های آمریکا ( تقسیم بندی اسپالدینگ )
۶۳	..... وسایل حیاتی ( Critical )
۶۳	..... وسایل نیمه حیاتی ( Semi-critical )
۶۳	..... وسایل غیر حیاتی ( Noncritical )
۶۳	..... طبقه بندی گندزداهای ضد عفونی کننده ها
۶۳	..... ضد عفونی کننده های High Level یا سطح بالا
۶۳	..... ضد عفونی کننده های سطح متوسط Intermediate Level یا
۶۴	..... ضد عفونی کننده های سطح پائین یا Level Low
۶۴	..... طریقه مصرف ضد عفونی کننده ها
۶۴	..... محلول های کنسانتره
۶۴	..... محلول های آماده مصرف
۶۴	..... دستورالعمل کلی در مورد کاربرد ضد عفونی کننده ها و گندزداهای ضد عفونی
۶۵	..... پاشیده شدن خون و مواد آلوده بدن در محیط ( لکه زدایی سریع )
۶۶	..... گندزدایی سطوح ، تجهیزات و ابزار پزشکی
۶۶	..... کف زمین

# **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

جدا سازی و تفکیک تی های مورد استفاده در بخش ها ..... ۶۶	
سطوح دیوارها ..... ۶۶	
توالت ..... ۶۶	
میز کار ، استیشن پرستاری و جلد دفاتر، تلفن، دستگیره دربهای ،تجهیزات کامپیوتر ..... ۶۷	
ترالی دارو - جا پرونده ای(Chart Plate) و پایه سرم ..... ۶۷	
گوشی پزشکی ..... ۶۷	
ساکشن ..... ۶۷	
یخچال ..... ۶۷	
ونتیلاتور و کلیه متعلقات، الکتروشوک ..... ۶۷	
رادیولوژی پورتابل ..... ۶۷	
سطلهای و بینهای بزرگ زباله ..... ۶۷	
کمد دارو- سینی دارو ..... ۶۷	
مانیتور، پالس اکسی متر ..... ۶۸	
لارنگوسکوپ ..... ۶۸	
متعلقات دستگاه بخار سرد ..... ۶۸	
آمبوبگ، ماسک و لیوان اکسیژن ..... ۶۸	
ابزار سرت ..... ۶۸	
ECG ..... ۶۸	
الکتروشوک ..... ۶۸	
دستورالعمل استفاده از صابون مایع ..... ۶۸	
روشهای مبارزه با حشرات و جوندگان ..... ۶۹	
سوسری ها ..... ۶۹	
مگس ها ..... ۶۹	
موش ها ..... ۷۰	

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

۷۰	اهم روش‌های مبارزه با حشرات و جوندگان
۷۰	استفاده از روش فیزیکی و مکانیکی
۷۱	استفاده از روش شیمیائی (استفاده از سموم و حشره کش‌ها)
۷۱	استفاده از روش‌های بیولوژیکی
۷۱	استفاده از روش تلفیقی
۷۱	مدیریت پسماندهای بیمارستانی
۷۲	تفکیک (مرحله اول)
۷۲	تعريف زباله بیمارستانی
۷۲	زباله‌های معمولی یا شبه خانگی
۷۲	زباله‌های عفونی و خطرناک
۷۲	زباله‌های تیز و برنده
۷۲	زباله‌های شیمیایی و دارویی
۷۲	جمع آوری (مرحله دوم)
۷۶	برچسب گذاری
۷۳	انتقال (مرحله سوم)
۷۴	دفع زباله (مرحله چهارم)
۷۴	رختشویخانه
۷۴	البسه کثیف (غیرعفونی)
۷۴	البسه آلوده (عفونی)
۷۵	دستور العمل تفکیک و جمع آوری البسه کثیف و آلوده
۷۵	دستور العمل شستشوی البسه بیماران (آلوده - کثیف) و پرسنل
۷۵	مرحله اول
۷۶	مرحله دوم
۷۶	مرحله سوم

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

..... ۷۶	مقدار استفاده از مواد شیمیایی در ماشین های لباسشویی رختشویخانه
..... ۷۶	بهداشت مواد غذایی
..... ۷۶	۲ فاکتور مهم در پیشگیری از بیماریهای باکتریایی ناشی از غذا
..... ۷۷	به طور خلاصه اصول کلی در تهیه و پخت و نگهداری مواد غذایی
..... ۷۷	منابع
..... ۷۷	ضمایم و دستورالعمل ها

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط



## بخش عمومی:

### **مقدمه :**

انسان ، از آغاز آفرینش ، برای پویایی زندگی خود ، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه ، سختی های بسیار متحمل شده است . نیروی کار هر کشور ، به ویژه کشورهای در حال توسعه ، بخشی از پر اهمیت از سرمایه های ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شود . از این رو ، حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار ، از اهمیتی شایان توجه برخوردار است .

بهداشت حرفه ای ، ابزاری است که به کمک آن می توان در راستای فراهم آوری ، نگهداری و بالا بردن سطح سلامت نیروی کار گام برداشت . بهداشت حرفه ای ، بر پیش بینی ، تشخیص ، ارزشیابی و کنترل عوامل محیطی یا فشارهای محیط کار متمرکز است که می توانند آسیب یا بیماری را سبب شوند و یا بر تندرستی کارکنان اثر سوء بگذارند .

### **تاریخچه بهداشت حرفه ای :**

پدیداری دانش بهداشت حرفه ای ، به عنوان یک تخصص ویژه و جدا از دیگر دانش ها ، به نسبت تازه است ، اما مفاهیم مطرح شده در این دانش ، از زمان های کهن مورد توجه بوده است . رامازینی ، نخستین پزشکی است که به توصیف پیشه های گوناگون و بیماری های ناشی از آن ها پرداخت و نخستین فردی بود که به پزشکان پیشنهاد کرد ، به هنگام پرسش های خود از بیمار ، پیشه ای او را نیز جویا شوند . زیرا ، ممکن است ارتباطی نزدیک میان پیشه ای فرد و بیماری او وجود داشته باشد .

**سازمان های بین المللی فعال در زمینه بهداشت حرفه ای :**

- ۱- سازمان بین المللی کار (ILO)
- ۲- سازمان بهداشت جهانی (WHO)

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

- ۳- سازمان های بهداشت و ایمنی صنعتی (OSHA)
  - ۴- مرکز پژوهش های ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH)
  - ۵- انجمن ملی حفاظت در برابر آتش سوزی (NFPA)
- سلامت شغلی (Occupational Health):**

"سلامت شغلی" تندرستی، ارتباط آن با کار و محیط کار را بررسی می کند . در آغاز ، گستره‌ی سلامت شغلی ، به آسیب‌ها یا بیماری‌های ، شغلی محدود می گردید ، که به کار ، شرایط کار یا محیط کار نسبت داده می شد . به تدریج ، بررسی‌های انجام شده مشخص ساختند که سه عامل یاد شده از جمله عوامل کمک کننده به بروز بیماری‌های غیر شغلی نیز هستند و از این رو ، دامنه‌ی سلامت شغلی گسترش یافت .

**هدف‌های سلامت شغلی ، عبارتند از :**

- تأمین ، نگهداری و بالا بردن سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی کارکنان در هر پیشه‌ای که هستند.
- پیشگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار
- حفاظت کارکنان در برابر عواملی که برای تندرستی زیان آور هستند.
- به کارگیری فرد در کاری که از نظر فیزیولوژیک و روانی توانایی انجام آن را داشته باشد.
- همخوانی کار با فرد و در صورت نبود امکان

**محتوای بهداشت حرفة‌ای :**

بهداشت حرفة‌ای ، عبارت است از ، دانش پیش‌بینی ، تشخیص ، ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در محیط کار . هدف آن ، تأمین ، نگهداری و بالا بردن سلامت و تندرستی کار آنان و در پایان ، ایمن نگهداشتن جامعه است . در بهداشت حرفة‌ای ، بیماری‌ها و عوارض حاد و مزمن ناشی از عوامل زیان آور محیط کار بررسی می شوند.

**مهم ترین وظایف مهندسی بهداشت حرفة‌ای عبارت است از :**

- ۱- بازرسی فنی محیط کار
- ۲- اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان آور فیزیکی ، عوامل شیمیایی محیط کار ، زیست شناسی ، عوامل زیان آور ارگonomیک
- ۳- بررسی روش‌های کار در کارگاه‌ها و ارایه‌ی روش بهینه
- ۴- بررسی وسایل حفاظت فردی و راهنمایی در نحوه‌ی استفاده از آن
- ۵- پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی در همه حرفة‌ها ( منظور از بیماری‌ها و حوادث شغلی آنها بیان است که در حین انجام کار و بواسطه آن رخ می دهند).
- ۶- تشکیل پرونده‌پزشکی پرسنل و بررسی وضعیت سلامتی آن‌ها .

یکی از اقداماتی که برای رسیدن به هدف بهداشت حرفة‌ای باید انجام گیرد ، مراقبت‌های بهداشتی - درمانی شاغلین است که از طریق معاینات قبل از استخدام ، معاینات دوره‌ای ، معاینات موردی انجام می پذیرد.

**هدف‌های اصلی معاینه دوره‌ای عبارتند از :**

- تشخیص زودرس بیماری‌های ناشی و مرتبط با کار و بیماری‌های غیر شغلی
- پیشگیری موارد مشکوک تا روشن شدن وضع آن‌ها

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری
- کنترل عوامل زیان آور محیط کار و محدود کردن کار در فرد بیمار
- جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری
- مطالعه اثرات زیان آور عوامل موجود در محیط کار
- تعیین اثر محیط بر سلامتی و بیماری کارگران
- ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی

**بیماری ناشی از کار :** بیماری هایی است که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی یا ارگونومی محیط کار وجود می آید .

**بیماری های مرتبط با کار :** بیماری هایی هستند با چند منشاء یا عامل مختلف که معمولاً در افراد جامعه وجود دارند و شغل یکی از عوامل بوجود آورنده ی آنهاست و احتمالاً حالت زمینه ای موجود را تشدید می کند.

### سلامت محیط و کار در بیمارستان :

بیمارستان ها در اکثر کشورها قسمت عمده ای از مراکز بهداشتی درمانی را تشکیل می دهند و بخش اعظم هزینه های بهداشت و درمان ( حدود ۷۰٪ ) را به خود اختصاص داده اند . مخاطرات عمدہ سلامت در بیمارستان ناشی از عدم اجرای مقررات بهداشتی ، مواد زائد جامد (زباله) ، فاضلاب ، رختشویخانه بیمارستان ، آب و مواد غذایی غیر بهداشتی و عدم مراعات نظافت عمومی و عوامل زیان آور حرفه ای نظیر عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیک و روانی و ... می باشند که کلیه بیماران ، ملاقات کنندگان ، کارکنان و در نهایت جامعه را در معرض این مخاطرات قرار می دهد .

شایع ترین مشکلات گروه شاغلین در محیط های درمانی و بهداشتی (بیمارستان) طبق آمار سازمان های جهانی who-niosh عوامل محیطی و حوادث و بیماریهایی نظیر سوراخ شدگی توسط سوزن ، اختلالات اسکلتی عضلانی ، صدمات کمری ، قطع اندام ، له شدگی و شکستگی ، تعرض توسط بیمار و همراهان آن ، امکانات ضعیف الکتریکی و مکانیکی و عدم وجود وسایل حفاظتی مناسب در برابر مواجهات شغلی است.

### عوامل زیان آور محیط کار :

- الف) عوامل فیزیکی : نظیر گرما ، سرما ، رطوبت محیط ، اشعه ، صدا ، روشنایی و ...
- ب) عوامل شیمیایی : نظیر عوامل ضدغوفنی کننده ، استریل کننده ها ، عوامل آزمایشگاهی ، داروها عوامل و گازهای بیهوده کننده ، محرکها و حساسیت زا ها ، سرطانزها و زباله و ....
- پ) عوامل بیولوژیک : Bac - TB - HCV - HIV - HBV و عفونت های بیمارستانی
- ج) عوامل ارگونومی : نظیر حرکات تکراری ، استفاده از نیرو به طور نامطلوب ، پوسچر نامناسب و ....
- د) عوامل روانی : شب کاری ، استرس و ...

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## بخش اختصاصی:



### **خطرات بهداشتی وایمنی:**

#### **عوامل زیان آور فیزیکی :**

- سرو صدا
- تهويه نامطلوب

#### **عوامل زیان آور شیمیایی :**

- تماس با پودر تالک در دستکش لاتکس
- ضدغوفونی کننده ها از قبیل الکل ۷۰ درصد ، پروکسان ، نانوسیل (سورفامد)
- شویننده ها از قبیل هیپو کلریت سدیم

#### **عوامل زیان آور بیو لوژیکی :**

- پاتوژنهایی که از طریق خون حمل می شوند مانند (HBS-HIV-HBV)
- ویروسهای منشرشده درهوا بخش واتاق گیرنده خدمت و بیماریهای ویروسی مثل سل مقاوم به درمان ، سرماخوردگی
- فصلی و میکرو ارگانیسم های مقاوم به دارو

#### **عوامل زیان آور ارگونومیکی و روانی :**

- کار نشسته یا ایستاده طولانی مدت
- بلند کردن
- وضعیت نامناسب بدن
- افتادن و لیز خوردن

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- استرس شغلی
- شیفت کاری

مخاطرات ایمنی :

- حریق
- گازهای فشرده
- تجهیزات الکتریکی
- بریدگی و لاسراسیون پوست

## عوامل زیان آور فیزیکی :

### ۱) سرو صدا :

اثرات صدا بر انسان :

صدا به صورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی تاثیر سوئ داشته باشد . البته این تاثیر از نظر اپیدمیولوژیک زمانی می تواند اهمیت داشته باشد که سبب اختلال فیزیولوژیک در بدن نماید . اثرات صدا از چند جنبه مورد توجه قرار می گیرد :

صدمه به دستگاه شنوایی ، اثر بر روی اندام بینائی ، اثر بر سیستم تعادلی ، ناراحتی اجتماعی ، اثرات عصبی ، اثر بر روی الکتروولیت ها ، اثرات روانی و ...

منابع ایجاد کننده آلودگی صوتی در داخل بیمارستان عبارت از :

رفت و آمد مراجعین ، بیماران و کارکنان ، سیستم تهویه ، حمل و نقل در داخل بیمارستان ، صدای بلندگو و سیستم صوتی بیمارستان و منابع خارج بیمارستان عبارت از تردد خودروها در خیابان های اطراف بیمارستان ، سر و صدای ناشی از ورود و خروج بیماران ، آمبولانس و بوق ماشی نها است.

راهکارها :

اصلاح سیستم های تهویه در بیمارستان ، استفاده از مواد جاذب صوت در سقف و دیوار اتاق های بیمارستانی ، تعمیر و روغن کاری وسایل حمل و نقل (ترالی) تغییر سیستم صوتی (پیجر) و استفاده از سیستم های عایق صوت .

### ۲) تهویه

تهویه مطبوع در بیمارستان :

تمامی فضاهای یک بیمارستان اعم از اتاقهای عمل ، جراحی ، ریکاوری ، بخش های بسترن ، آزمایشگاهها و ... نیاز به گرمایش در زمستان و سرمایش در تابستان را دارند . دما و درصد رطوبت و نیاز هوای تازه در بعضی از فضاهای دارای اهمیت زیادی است و در بعضی دیگر از فضاهای دارای اهمیت خاصی نیست .

تحقیقات پزشکی نشان داده شده است که کنترل دما و رطوبت و استفاده از تهویه مطبوع برای معالجه و درمان بیماران بسیار موثر و مفید است . برای مثال تامین محیط گرم برای مدت نسبتا طولانی سبب بهبود بیماران مبتلا به روماتیسم می گردد .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

تمامی موارد فوق بیانگر این مطلب است که بحث تهویه مطبوع در بیمارستان علاوه بر ایجاد آسایش انسان هدف درمان را نیز دنبال می کند . همچنین فرق عمدۀ سیستمهای تهویه بقیه ساختمانها با بیمارستان این است که شرایط طرح داخل بایستی شرائط تمیز و عاری از عفونت و آلودگی باشد . برای رسیدن به این هدف بایستی مسیر حرکت هوا در تمامی فضاهای تحت کنترل باشد .

فیلتراسیون هوا و خارج نمودن هوای محیط های کثیف و بو دار نیز از وظایف طراحان تاسیسات بیمارستان است .

### طرح داخل از لحاظ دما و رطوبت :

بر اساس کارهای تجربی و آزمایشی انجام شده شرائط طرح داخل کلیه فضاهای بیمارستانی چه در تابستان و چه در زمستان توسط **ASHRAE** تعیین شده است.

مکان	دما(فارنهایت)	رطوبت نسبی(درصد)
بخش های بستره	۷۵-۶۸	۳۰-۶۰

### عوامل زیان آور شیمیایی :

#### ۱) تماس با پودر تالک در استفاده از دستکش لاتکس



کارکنان در تماس با دستکش های لاتکس و دیگر محصولات حاوی لاستیک طبیعی لاتکس ، ممکن است در معرض واکنش های آلرژیکی همچون خارش های پوستی ، کهیر ، علائمی در بینی ، چشم و سینوسها ، آسم و بندرت شوک باشند . کارکنانی که بطور مداوم با لاستیک های طبیعی لاتکس در تماس هستند باید با برداشتن گامهای زیر از خود محافظت نمایند:

➢ برای فعالیتهایی که احتمال تماس با مواد عفونی نیست ( تهیه غذا ، نظافت روتین اتفاقها ، تعمیر و نگهداری ) از دستکش های غیر لاتکس استفاده کنید .

➢ در هنگام حمل دستی عفونی مواد استفاده از مانع حفاظتی مناسب ضروریست . اگر شما از دستکش های لاتکس استفاده می کنید ، بهره گیری از دستکش های عاری از پودر موجب کاهش میزان حفاظت می گردد .

➢ در هنگام استفاده از دستکش های لاتکس از کرمها یا لوسیونهای چرب استفاده نکنید ( که می تواند موجب از بین رفتن دستکش شود) مگر اینکه آنها موجب کاهش مشکلات مرتبط با لاتکس شده و حفظ کننده مانع حفاظتی دستکش باشد .

➢ روش تشخیص علائم آلرژی لاتکس را بیاموزید : تحریک پوست ، کهیر ، قرمزی ، خارش ، علائم بینی ، چشم و سینوسها ، آسم و شوک .

➢ اگر علائم آلرژی به لاتکس در شما گسترش یافت ، از تماس مستقیم با دستکشها و محصولات لاتکس تا زمانیکه با یک پزشک با تجربه در خصوص آلرژی لاتکس دیدار کنید ، اجتناب نمائید .

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

: MSDS ( Material Safety Data sheet ) برگه اطلاعات ایمنی مواد



به برگه هایی که اطلاعاتی در مورد خطرات بالقوه و روش ایمن کار با مواد به ما می دهد ، اصطلاحا MSDS یا "برگه اطلاعات ایمنی مواد" می گویند .

MSDS همچنین حاوی اطلاعات مفیدی در مورد کاربرد صحیح و ایمن ، روش نگهداری و انبارش ، روش صحیح حمل و نقل و واکنش صحیح در شرایط اضطراری در مقابل یک ماده یا یک محصول خاص است .


**MSDS شامل موارد زیر است :**

خطرات بهداشتی : به عنوان مثال تماس پوست با اسید باعث سوختگی می گردد .

خطرات حریق : به عنوان مثال پروپان خیلی آسان می سوزد و ممکن است منفجر شود .

خطرات واکنش پذیری : به عنوان مثال ترکیب آمونیاک و سفید کننده های خانگی باعث انتشار گاز های مضر می گردد .

**لوزی خطر :**



خطرات مواد شیمیابی توأم با ازدیاد مصرفشان در صنایع مختلف افزایش یافته و از طرفی چون بخاطرسپردن خطرات مواد شیمیابی گوناگون و چگونگی مقابله با آنها برای هر شخص امکان پذیر نیست . بنابراین جهت سهولت در مورد آگاهی از خطر هر ماده شیمیابی از یک لوزی چهار خانه استفاده می شود . تا هر شخصی با توجه به آشنایی قبلی با مشخصات این لوزی از چگونگی خطرات آن ماده شیمیابی آگاه گردد .

این لوزی به چهار بخش تقسیم شده است که هر رنگ پیام ویژه ای دارد .

رنگ قرمز : نشان دهنده قابلیت اشتعال می باشد .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

**رنگ آبی :** نشان دهنده خطرات بهداشتی (خطرو ماده شیمیایی برسلامتی) می باشد .

**رنگ زرد :** قابلیت فعل و انفعال شیمیایی (پایدار و از نظر ترکیب با آب ) را نشان می دهد .

**رنگ سفید :** دارنده نشان های ویژه برای خطرهای خاص می باشد .

هر کدام از موارد (قابلیت فعل و انفعال شیمیایی ، قابلیت اشتعال ، خطرات بهداشتی ) به پنج درجه از درجه ( صفر تا درجه ۴ ) تقسیم می شوند

بطوریکه درجه صفر نشان دهنده بی خطری و درجه ۴ نشان دهنده خطر بسیار شدید می باشد.

این درجه بندی در مورد خطرات خاص وجود ندارد .

**مواد محرك :** دارای اثر سوزاننده و تاول آور بوده و سطح مخاط مرطوب را متورم می کنند .



**مواد خورنده :** موادی که در صورت تماس با نسوج و بافت های زنده به طریق شیمیایی باعث تخرب یا تغییر غیرقابل بازگشت در آن ها می شود .



**مواد اکسیدکننده :** اکسیدکننده ها عواملی هستند که سبب آتش سوزی می شوند یا به گسترش اشتعال سایر مواد کمک می کنند ، در نتیجه یا آتش می گیرند و یا سبب آزاد شدن اکسیژن ، یا گازهای دیگر می شوند .



**مواد آتشگیر :** به موادی اطلاق می شود که به طور خود بخود در هوای ( دمای پایین تر از ۴۰ درجه سانتی گراد ) مشتعل می شوند . مواد آتشگیر عموما با آب واکنش پذیر هستند و در صورت تماس با آب یا هوای مرطوب آتش خواهند گرفت .



**مواد منفجر شونده :** ترکیب قابل انفجار، ترکیبی است که در صورت قرار گرفتن در معرض ضربه ناگهانی، فشار یا دمای بالا، سبب آزاد کردن مقادیر زیادی حرارت و گاز با فشار زیاد به محیط می شود .



# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## ۲) تماس با ضد عفونی کننده ها



ضد عفونی کننده ها و شویننده ها که بصورت روزانه برای ضد عفونی و شستن دست ها بصورت مکرر ، استریل کردن سطوح و وسایل و تجهیزات بکار می روند و ممکن است در طولانی مدت سبب حساسیتهای پوستی شوند . بنابراین استفاده از وسایل حفاظت فردی ، داشتن اطلاعات کافی درباره مواد ، استفاده از کرمها مرطوب کننده ، تغییر در نوع ضد عفونی کننده ها هنگام ایجاد حساسیتهای پوستی ضروری می باشد .

مواد شیمیایی مورد استفاده در این واحد الكل ۷۰ درصد ، بتادین و نانوسیل ( سورفامد ) می باشد .

### ۱-۲-الکل ۷۰ درصد :

مخاطرات :

اثر بر سلامتی انسان :

- ایجاد حالت تخدیر و خواب آلودگی در سیستم اعصاب مرکزی می کند .
- به شدت برای چشم محرک بوده و موجب تحریک دستگاه تنفسی می شود .
- برای پوست نسبتاً محرک است .
- باعث بروز تغییرات و ناهنجاری در جنبش انسان می گردد .
- در تماس های مزمن به سیستم اعصاب مرکزی ، قلب ، کبد و کلیه ها آسیب جدی وارد می کند .

احتیاطات ایمنی - بهداشتی :

در صورت تماس با چشم : پلک ها را کاملاً از هم باز نگهداشته و چشم ها را با مقادیر زیادی آب به مدت حداقل ۱۵ دقیقه بشویید .

در صورت تماس با پوست : فوراً لباس های آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادیر زیادی آب و صابون به مدت حداقل ۱۵ دقیقه بشویید . قبل از استفاده مجدد از لباس ها آنها را آبکشی نمایید .

در صورت بليعدن و خوردن : فرد مسموم را وادر به استفراغ نکنيد ، اگر هوشيار است به او ۲ فنجان آب يا شير بنوشانيد . اگر فرد بيهوش است به او چيزى نخورانيد . درصورتى که بدهال است او را به پزشك برسانيد .

در صورت تنفس : فرد مسموم را به هواي آزاد منتقل کرده ، در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهيد . درصورتى که تنفس با مشکل انجام می شود به او اکسيژن وصل کرده و اگر بهتر نشد را به پزشك برسانيد .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

### ۲-۲- پروگسان :

مخاطرات :

اثر بر سلامتی :

از طریق تماس مستقیم ، تماس با چشم و غشاء تنفسی برای انسان مضر است .

احتیاطات ایمنی - بهداشتی :

در صورت تماس با چشم : شستشوی مستقیم با آب سرد فراوان

در صورت تماس با پوست : شستشوی مستقیم با آب سرد فراوان

در صورت تنفس : تنفس در هوای آزاد

### ۲-۳- نانوسیل ( سورفامد ) :

مخاطرات :

اثر بر سلامتی :

- تحریک بینی و گلو و منجر به عطسه و سرفه می شود .

- تحریک شدید چشم ، آبریزش از چشم و تورم پلک ها

- تحریک و سفید شدن موقتی پوست ، قرمزی و تورم پلک ها

- رنگ پریدگی و سیانوز شدن صورت

- تحریک شدید ، سوختن مخاطات و سوراخ شدن دستگاه گوارش

- جمع شدن مایعات در دهان و بینی

- ادم گلو

- تورم و نفخ معده

احتیاطات ایمنی - بهداشتی :

استنشاق : فرد مورد نظر را سریعا از محیط آلوده دور کنید . در صورت بروز هر گونه علائم تنفسی سریعا پزشک را در جریان قرار دهید .

تماس با چشم : سریعا چشم ها را در حالیکه پلک ها را با نگه داشته اید با آب به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید . در صورتیکه باز نگهداشتن پلک ها سخت و دردناک است از محلول مسکن شوینده چشم استفاده شود . در همه موارد به چشم پزشک مراجعه شود .

تماس با پوست : کلیه پوشش های آلوده را زیر دوش در آورده و موضع را با آب فراوان شستشو دهید . موضع را پ.شانده و گرم نگه دارید و از لاس های کاملا تمیز استفاده شود .

خوردن : در صورتیکه فرد به هوش باشد : دهان را با آب شیر پر فشار شستشو دهید . به هیچ عنوان فرد را وادار به استفراغ نکنید . اگر فرد بیهوش است ، اقدامات اولیه را جهت احیا و بیهوش آور او انجام دهید .

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## (۳) تماس باشونده ها :

وایتکس :



در بخش‌های بستری از شوینده‌های مانند هیپو کلریت سدیم جهت ازبین بردن لکه‌ها، نظافت و گندزدایی استفاده می‌شود.

**مخاطرات :**

باعث سوختگی پوست و چشم می‌شود. بلعیدن، تنفس و جذب پوستی آن می‌تواند آسیب جدی وارد کند. باعث تحریکات پوستی می‌شود.

**احتیاطات ایمنی و بهداشتی :**

در صورت تماس با چشم : به سرعت و با استفاده از چشم شوی یا پیست محتوى آب تمیز چشمها را بشویید و بلاfacله به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت تماس با پوست : بلاfacله همه لباس‌های آلوده به این ماده را از تن خارج کنید و پوست را با آب شست و شو دهید در صورت مشاهده هر گونه تحریک پوستی به پزشک مراجعه کنید.

در صورت بلعیدن و خوردن : دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه بشویید بعد مقادیر آب زیادی بنوشید فرد مسموم را وادر به استفراغ نکنید و به سرعت به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت تنفس : تنفس بخارات این محلول سمی است و باعث مسمومیت می‌شود.

**احتیاط در زمان وقوع حادثه :**

- با اسیدها مخلوط نکنید چون به شدت واکنش داده و گاز سمی کلر آزاد می‌کند.
- در صورت ریخت و پاش در محیط محل را به سرعت و با مقادیر زیاد آب شسته دهید.

**احتیاطات ایمنی در جابجایی دستی و انبارداری :**

- در هنگام جابجایی دقت کنید هیچ گونه نشی نداشته و در بظروف کاملاً بسته باشد. نشت آن باعث خوردگی سریع و شدید اشیاء مختلف می‌شود.
- دور از نور و در محل تاریک در ظروف تیره رنگ نگهداری شود.


**توصیه‌های ایمنی جهت پیشگیری از حوادث ناشی از تماس با مواد شوینده :**

- ۱) هنگام استفاده از شوینده‌های شیمیایی، حتماً از ماسک مناسب استفاده کنید.
- ۲) در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده‌های شوینده و پاک کننده، پنجره‌ها را باز کرده و تهویه را روشن نمایید تا هوا بخوبی در محیط جریان داشته باشد.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- (۳) از مخلوط کردن مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده جدا خودداری کنید ، بخار ها و گازهای ناشی از این اختلاط بسیار سمی و خفه کننده می باشد .
- (۴) بخار متصاعد شده از ترکیب جوهرنمک و واپتکس بسیار خطرناک است ، خصوصا برای چشم ، پوست و ریه . توصیه می شود از ترکیب این دو ماده خودداری کنید .
- (۵) محصولات شیمیایی و شوینده را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید هیچگاه این مواد را در ظرف مواد خوراکی (مانند بطری نوشابه ) نگه داری نکنید .
- (۶) همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعا درب آن را ببندید .
- (۷) در صورت امکان از مواد شوینده کم خطر تر استفاده گردد .

### عوامل زیان آور بیولوژیک :



- پاتوژنهای که از طریق خون حمل می شوند مانند (HBS-HIV-HBV)
- ویروسهای منشرشده در هوای بخش و اتاق گیرنده خدمت و بیماریهای ویروسی مثل سل مقاوم به درمان ، سرماخوردگی فصلی و میکرو ارگانیسم های مقاوم به دارو

### راه های انتقال HBV در مراعز همو دیالیز

توضیحات	راه انتقال
بدلیل غربالگری خون های افراد دهنده از نظر HBsAg و anti – HBC انتقال ویروس از این راه غیر شایع می باشد	تریک خون و فراورده های خونی
انتقال از راه فرو رفتن سوزن آلوده / وسائل نوک تیز و مواجهه پوستی غیر مشخص	انتقال از بیمار به پرسنل
انتقال از طریق خون آلوده به HBV موجود روی وسایل لوله و سطوح محیطی	انتقال از بیمار به سیستم دیالیز و از این سیستم به پرسنل
دست زدن مکرر به دستگاه دیالیز یا سطوح وابسته محیطی که ممکن است منبع HBV باشند ، انتقال توسط دستکش یا دست های آلوده پرسنل	انتقال از بیمار به سطوح خارجی سیستم دیالیز و از این طریق به دست پرسنل و از دستهای پرسنل به بیمار دیگر

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

### جراحات و اتفاقات عمدہ :

- \* فرورفتگی سرسوزن به دست کارکنان بهداشتی- درمانی
- \* پاشیدن خون و سایر ترشحات آلوده بدن بیمار به :
  - بریدگی های باز
  - چشم ها
  - غشاء مخاطی
  - گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم می شود .

اقدامات پیشگیرانه برای فرد که در معرض تماس با مایعات عفونی قرار دارد:

- \* استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب ( دستکش ، روپوش ، عینک ایمنی و ماسک )  
نکته : در صورتی که بریدگی و یا زخمی در دستها وجود دارد الزامی است از دستکش استفاده شود و موضع با پانسمان ضدآب پوشانده شود .

- \* جهت حفاظت بدن در قبال آلودگی با خون و یا ترشحات بدن ، استفاده از پیش بند پلاستیکی یکبار مصرف ضروری است .
- \* در صورتی که احتمال ترشح خون و یا قطعاتی از نسوج و یا مایعات آلوده بر چشم و غشاء مخاطی وجود دارد استفاده از ماسک و عینک محافظ ضروری است .
- \* در صورتی که کارکنان دچار اگزما و یا زخم های باز می باشند ، معاینه ای پزشک جهت مجوز شروع به فعالیت در بخش ضروری است .



در صورت مواجهه حاد با خطرات بیولوژیکی :

- \* شستشوی مناسب عضو در معرض تماس با صابون و آب گرم
- \* کمک به خونروی از محل اولیه ی زخم
- \* انجام کمک های اولیه برای آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده
- \* خودداری از مالش موضعی چشم
- \* شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی
- \* گزارش فوری سانحه به سوپر وایزر بالینی
- \* جلوگیری از قرار گرفتن در معرض خطر بالا

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

عوامل زیان آور ارگونومیک :

## (۱) کار نشسته یا ایستاده طولانی مدت :

شایعترین بیماری ناشی از ایستادن برای مدت زمان طولانی عبارتند از :

۱- واریس :



سیاهه‌گ واریسی ، در نتیجه اختلال عملکرد دریچه‌های موجود در سیاهه‌گ‌ها ، ایجاد می‌شوند به طوری که در حالت طبیعی ، این دریچه‌ها از بازگشت خون در مسیر عکس (به سمت پایین) جلوگیری کرده و ممکن است براثر عواملی مانند ضعف مادرزادی ، چاقی یا ایستادن طولانی مدت تحت کشش قرار گیرند .

روشهای پیشگیری از بیماری واریس :

- پوشیدن کفش مناسب و طبی در پیشگیری از پا درد ناشی از راه رفتن و ایستادن برای مدت زمان طولانی ، بسیار موثر است.
- اگر مجبور هستید در محلی بی حرکت بمانید اندامهای پایینی مانند زانوها و مچها را مرتب خم کنید .
- بالا کذاشتن پاهای حداقل ۳۱ سانتی متر بالاتر از قلب در انتهای روز به برطرف شدن تورم کمک می کند .
- فعالیت هایی مانند راه رفتن ، دوچرخه سواری یا شنا ، به کاهش فشار در سیاهه‌گها و تخفیف ناراحتی ناشی از واریس ، کمک میکند .
- استفاده از جوراب واریس : صحبتها پس از بیدار شدن از خواب بپوشید و در تمام طول روز به پا داشته باشید . دقت کنید جورابهایی که می پوشید در ناحیه بالایی ران یا ساق پا خیلی تنگ نباشد .

## (۲) بلند کردن و جابجایی اجسام سنگین

به طور کلی دو حالت متمایز برای بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است اتفاق افتد :

- ❖ حالتی است که طی آن ستون فقرات کاملاً به صورت کشیده و مستقیم نگه داشته می‌شود ، زانو‌ها خم شده و بار با دست ها به صورت محکم گرفته می‌شود و سپس با نیروی عضلات پا ، بار به طرف بالا هدایت می‌شود . در این روش نیروهای واردہ بر ستون فقرات در حد قابل ملاحظه‌ای کنترل می‌شوند ، اما نیروی زیادی به زانوها وارد می‌شود .




- ❖ حالتی است که طی آن ستون فقرات خم شده و پاهای مستقیم هستند در واقع بلند کردن بار به این روش باعث می‌شود که نیروهای زیادی بر دیسک های بین مهره ای اعمال شوند .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط



هر دو حالت غیر ایمن هستند .

بهترین و مناسبترین حالت و شرایط ایمن جهت بلند کردن بار ، شکل زیر است . چنانچه مشاهده می کنید با خم کردن زانو ها و کمر وزن بار به طور مساوی بین کمر و زانو تقسیم شده و در نتیجه فشار کمتری به این اعضاء وارد می شود .



روش‌های پیشگیری :

- استفاده از تراکیهای چرخدار جهت حمل اجسام
- بکار گیری روش صحیح حمل و جابجایی بار بر اساس روش مذکور
- حذف حرکات چرخشی ، خم شدن نامناسب و برداشتن یکباره و ناگهانی اجسام ( بدلیل صدمه زدن به ستون مهره )
- کمک گرفتن از همکاران
- استفاده از روش هل دادن به جای کشیدن ، هنگام جابجایی بار ( دراین روش ۱۲ درصد انرژی کمتر مصرف میشود )
- متناسب بودن کار واگذار شده با قدرت بدنی و روانی کارکنان
- ورزش کردن بصورت روزانه و منظم
- کاهش فشار بیش از حد هنگام جابجایی ، به عضلات با بکار گیری وسایل دسته دار

### (۳) پوسچرهای نامناسب بدنی

پوسچرهای نادرست :

به وضعیت و حالت بدن در حین کار کردن پوسچر گفته میشود . حرکاتی مثل چرخیدن - خم شدن به جلو و عقب با زوایای باز در حین کار کردن و حمل بار پوسچرهای نادرستی است زیرا به مفاصل بدن بخصوص کمر فشار بیش از حد وارد کرده و موجب بروز کمر درد و حتی فتق دیسک بین مهره ای میشود .

پوسچرهای نادرست باعث میشود تا عضلات بیشتری تحت فشار و انقباض باشند . و به مدت طولانی موجب خستگی و فرسودگی عضلات و تاندونها میشوند .

انواع پوسچرهای نادرست رایج در بیمارستان :

- ۱) چرخیدن در حین بلند کردن بار
- ۲) خم شدن روی بار

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

(۳) خم شدن بیش از حد به جلو یا عقب

(۴) خم شدن به اطراف

(۵) خم کردن و فشار آوردن به کمر هنگام بلند کردن - پائین آوردن یا حمل کردن بار

(۶) بالا نگهداشتن بازوها به مدت چند دقیقه

(۷) پوسچرهای نادرستی که در طول یک شبیت یک ساعت یا بیشتر بطول می انجامند

(۸) چرخیدن یا خم شدن به جلو برای نگهداری تعادل بیمار از پشت و کمک به راه رفتن او

**روشهای حذف پوسچرهای نادرست :**

(۱) آموزش به کارکنان در خصوص روشهای حمل ایمن

(۲) در صورت امکان از لوازم و تجهیزات کمکی برای حمل بیماران استفاده نمائید

(۳) حمل را چند نفره و گروهی انجام دهید

(۴) سطح و فضای مناسب برای بدن که کمربندی به خم و چرخش نباشد در محیط کار وجود داشته باشد.

(۵) هنگام برداشتن یا گذاشتن ستها داخل قفسه ها گاهی مجبور می شوید دستها را در ناحیه بالا تر از حد شانه مکررا بالا برده و بدین ترتیب زمینه را برای دردهای شانه فراهم می کند . تکرار این پوسچر در طولانی مدت باعث بیماری سندروم مدخل خروجی قفسه سینه می شود . بنابراین کارکنان نبایستی برای دسترسی به بخش های مرتفع روی صندلی و جعبه و چهار پایه بایستند بلکه باید از نردهای مناسب و ایمن استفاده کنند .

(۶) کار کردن زیاد با دستها (انگشتان و مج) هنگامی که حرکات تکراری انجام می دهید در طولانی مدت منجر به بروز بیماری تونل کارپال می شود .

### سندروم تونل کارپال (از بیماریهای شایع و دردناک در ناحیه مج دست)



#### علل و عوامل:

معمولاً به دلیل استفاده بیش از حد از مج دست به ویژه در موارد کارهای ظریف و تکراری ایجاد می شود و اصولاً به دنبال انجام مکرر کارهایی که با دست و مج انجام می شود علایم بروز می کند.

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

### **علائم و نشانه ها :**

- ۱- درد در انگشت شست ، نشانه و میانی است به سمت ساعد و بازو هم کشیده می شود. شب ها افزایش می یابد با افزایش استفاده از دست مثل زمان رانندگی یا خواندن روزنامه افزایش می یابد . با تکان دادن و فشار به کف همان دست کاهش می یابد .
- ۲- بی حسی و سوزش در انگشت شست ، نشانه و میانی که به سمت ساعد و بازو کشیده می شود .
- ۳- احساس فشار در یک یا هر دو دست که گاهی این علایم متوجه ساعد می شود در موارد شدیدتر حتی شانه ها هم درگیر می شوند .
- ۴- فلنج انگشتان شست ، اشاره ، میانی و نصف انگشت چهارم در بعضی موارد
- ۵- عدم توانایی در گرفتن اشیاء و افتادن اشیا از دست
- ۶- تغییر شکل ناخنها و خشکی پوست دست و انگشتان
- ۷- حساسیت به سرما

### **عوارض :**

خطر التهاب تاندونها در بیمارانی که با وجود گرفتاری مج دست و بروز علایم C.S.T به همان فعالیتهای سابق ادامه می دهند ، وجود دارد افزایش فشار روی کانال کارپال و نرسیدن خون به این ناحیه موجب از دست دادن تحرک مج دست و صدمات عصبی جدی و ماندگار می شود .

### **پیشگیری :**

در صورتی که شما به کاری مشغول هستید که مکررا با دست انجام داده می شود اطمینان حاصل کنید که مج شما در زمان کار در وضعیت راحتی قرار گرفته است و در طول کار ، فواصل استراحت منظم داشته باشد.

### **(۴) افتادن و لیز خوردن**

این اتفاقات اغلب در اثر وجود مخاطرات محیطی از این قبیل رخ می دهد :

- کف لیز یا خیس
- کف غیر هم سطح
- حمل بار در فضای محدود
- وجود موائع در راه های عبوری
- مسیرهای عبور کثیف و پرمانع یا تجهیزات معیوب
- روشنائی ضعیف بخصوص در شیفت شب

### **راهکارهای کنترلی خطرات افتادن و لیز خوردن :**

- (۱) نگهداری و سرویس به موقع تجهیزات ، نظم و نظافت و مهم تر از همه دقت و احتیاط کارکنان در انجام وظایف مانع از بروز حوادثی مثل افتادن و لیز خوردن می شود . دیگر اقدامات موثر شامل :
  - (۲) حذف سطوح غیر هم سطح

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

- (۳) حذف سطوح لیز در حمام و دست شوئی ها
- (۴) برطرف نمودن به موقع مایعاتی که ببروی زمین ریخته و باعث لیزی کف می شوند .
- (۵) به روش ایمن در محیط های بسته و محدود کار کنید و درهنگام بلند کردن بار در این فضا ها از وسایل کمکی استفاده کرده و مراقب باشید که دچار آسیب نشوید .
- (۶) به حداقل رساندن تعداد فضاهای کاری کوچک و محدود ( انبارها و گنجه ها و راهروهایی که امکان تحرک در آن ها به حداقل میرسد ) .
- (۷) به حداقل رساندن موارد حمل دستی بارهای سنگین

### **(۸) استرس :**



کار بیمارستانی اغلب اوقات نیازمند تقبل برخی از موقعیت های پر استرس بوده که در هر مکانی از بیمارستان استرس یافت می شود .

#### **اثرات بهداشتی :**

استرس باعث از دست رفتن اشتها ، زخم معده ، اختلالات روانی ، میگرن ، اختلال در خواب کامل ، مختل شدن زندگی خانوادگی و اجتماعی ، افزایش مصرف سیگار ، الكل ها و داروها می گردد . استرس همچنین می تواند بر رویه و رفتار کارکنان نیز تاثیر بگذارد . برخی از نتایج گزارش شده در خصوص وجود استرس در میان کارکنان بیمارستان ، موارد کثیری از بد رفتاری ، مشکلات ارتباطی با بیماران دارای وضعیت وخیم ، عدم حفظ روابط کاری مطلوب با سایر همکاران و قضاوت در مورد و خامت یک فوریت بالقوه را نشان می دهد .

#### **راه های کنترلی :**

- تشکیل جلسه های منظم برای پرسنل به منظور تبادل احساسات ، افکار ، تصمیم گیری ها ، برخورداری از حمایت های لازم و در میان گذاشتن عقاید و نظرات جدید .
- تلاش در ایجاد حس همکاری و انعطاف پیشتر کارکنان در برنامه های کاریشان

### **(۹) نوبت کاری :**

نوبت کاری از جمله پدیده های اجتماعی است که ریشه در تاریخ انسان دارد و امروزه نیز به دلایل اقتصادی و تکنولوژیک وجود دارد .

نوبت کاری چیست؟ منظور از نوبت کاری هر نوع کاری است که در خارج از ساعت معمول کار روزانه ( ۷ صبح الی ۶ بعد از ظهر ) انجام شود و شامل :

- شیفت های ثابت شب ، شیفت های ثابت دیگر ( از قبیل شیفت عصر ) و یا شیفت های که قبل از ۶ صبح شروع می شود

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

- شیفت های چرخشی که زمان کار از روز به عصر یا از روز به شب تغییر یابد که این ممکن است بصورت هفتگی یا ماهیانه باشد .

نوبت کاری در شب منجر به بروز اثرات سوء بهداشتی می شود . بنابراین آگاهی از خطرات بهداشتی مربوط به نوبت کاری و تنظیم ساعت های کار و استراحت بر اساس الگوهای پیشنهادی استاندارد بسیار موثر است .

### **عوارض شب کاری :**

- خطرات بهداشتی
- مشکلات خانوادگی و اجتماعی
- پیامدهای ایمنی و اثر بر روی عملکرد شغلی

افراد نوبت کار می توانند اثرات نوبت کاری را بر روی سلامتی خودشان و زندگی اجتماعی شان کاهش بدهنند به وسیله :

- محافظت از دوره های خواب به وسیله تنظیم دوره های استراحت و بیداری (خود داری از فعالیت نمودن قبل از دو ساعت مانده به زمان خواب)

- خاموش کردن چراغها و قطع تلفن و خوابیدن در محیط آرام و ساكت
- نگهداری منظم وعده های غذایی و خوردن غذا در این وعده ها و انتخاب غذای حاوی کربوهیدرات ها و خودداری از خوردن غذای حاوی پروتئین و چربی بالا و سنگین قبل از رفتن به خواب
- اثرات بالقوه شیفت کاری را به خانواده و دوستانشان یادآوری نمایند .
- برنامه زندگی خود را طوری تنظیم نمایند تا وقت کافی برای گذراندن با فامیل ها و دوستان وجود داشته باشد .
- توانایی فیزیکی شان را حفظ نمایند .
- تعداد نوبت های کاری شبانه باید کم باشد و اینگونه افراد پیش از شروع کار، حداقل سه ساعت در مکانی مناسب بخوابند

- افراد شب کار باید عادت کنند همواره در یک زمان مشخص از روز بخوابند . بهترین کار این است که زمان خوابیدن شان ساعت های قبل از کار باشد ، نه اول صبح . اگر این کار مقدور نیست ، بهتر است قبل از روانه شدن برای کار ، یک چرت کوتاه بزنند زیرا چرت های کوچک در شیفت کاری می تواند بسیار نیرو بخش باشد .

- شب کارها بهتر است مرخصی هایشان را جمع نکنند ، بلکه از آن در بین شیفت ها استفاده کنند تا به این صورت ، هم به کارهای عقب افتاده خود برسند و هم روابط اجتماعی و خانوادگی شان را بخوبی حفظ کنند .

### **مخاطرات ایمنی**

#### **(۱) حریق :**

آتش سوزی از حوادثی است که هر آن ممکن است اتفاق افتاده و جان و مال فرد ، افراد یا موسسه را در عرض چند دقیقه بر باد دهد . اغلب بی مبالاتی و بی دقیقی در کار و کم اهمیت جلوه دادن حریق و مسائلی از این قبیل موجب ایجاد حریق می شود . با پیش بینی های لازم و به کار بردن دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفة ای می توان جلوی بسیاری از آتش سوزی ها را گرفت

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

نتایج بررسی های آماری نشان داده که قریب ۷۵ درصد آتش سوزی ها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند . در مورد ۲۰-۲۵ درصد باقیمانده نیز می توان با اتخاذ تدبیری میزان خسارت وارد را به حداقل رسانید . و این تنها با بکار بردن موثرترین ادوات و تجهیزات آتش نشانی که هر روزه در جهان در حال تکامل و تحول می باشند ، امکان پذیر است .

مثلث حریق :



دسته بندی انواع حریق :

آتش دسته A :

این نوع آتش سوزی از سوختن مواد معمولی قابل احتراق عموماً جامد است . شامل کاغذ ، پارچه ، پلاستیک و امثال آن که پس از سوختن خاکستر بر جای می گذارد . خاموش کننده هایی که برای آن ها استفاده می شود علامت مثلث شکل سبز رنگ با نشان A دارند . مبنای اطفای آن ها سرد کردن است .



آتش دسته B :

این آتش سوزی در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به مایع را دارند پدید می آید . برخی از این مواد ممکن است حلال در آب نیز باشند . بنابراین استفاده از آب برای اطفای آن ها مناسب نیست . خاموش کننده آن ها مربع قرمز رنگ با علامت B است . اطفای این حریق مبتنی بر خفه کردن است .



آتش دسته C :

این آتش سوزی ناشی از گاز یا مایع و یا مخلوطی از آن هاست که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به گاز را دارند . مانند گاز شهری و گاز مایع . خاموش کننده آن ها مربع آبی رنگ با علامت C است . مبنای اطفاء خفه کردن و سد کردن مسیر نشت است .

آتش دسته D :

این نوع حریق ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده است . خاموش کننده آن ها ستاره زرد رنگ با علامت D است .

آتش دسته E :

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

این دسته شامل حریق های الکتریکی است مانند سوختن کابل تابلو های برق یا وسایل برقی و حتی سیستم های کامپیوتری . راه اطفاء این دسته قطع برق و خفه کردن حریق با گاز CO<sub>2</sub> یا هالوژن است .



آتش دسته F :

این دسته شامل حریق آشپزخانه و مواد سوختنی مهم مانند روغن و چربی .

مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها :




۱. اعلام حریق
۲. اطمینان از توان خاموش کردن
۳. حفظ خونسردی
۴. تشخیص نوع حریق
۵. حرکت به سوی خاموش کننده
۶. تشخیص خاموش کننده با توجه به مشخصات کپسول و برچسب های روی سیلندر
۷. انتخاب خاموش کننده مناسب و برداشتن آن
۸. انتقال خاموش کننده به محل حریق
۹. راه اندازی خاموش کننده
۱۰. پشت به باد ایستادن
۱۱. بکارگیری مواد خاموش کننده در فرایند اطفاء
۱۲. نشانه روی بروی پایه یا ریشه حریق
۱۳. حرکات جارویی روی ریشه حریق
۱۴. چشم دوختن روی حریق
۱۵. ادامه اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق

نکات مهم در به کار گیری خاموش کننده های دستی :

- ۱- نوع آن ها متناسب با نوع حریق باشد .
- ۲- فاصله دو کپسول نبایستی بیش از ۳۰ متر باشد .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- ۳ ارتفاع مناسب قرار گیری کپسول تا سطح زمین ۱/۱ متر باشد . چنانچه وزن خاموش کننده بیشتر از ۱۸ کیلو باشد حداکثر در ارتفاع ۱ متری از سطح زمین نصب شود .
- ۴ برای هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود .
- ۵ توزیع یکنواخت صورت بگیرد .
- ۶ در نزدیکی ورودی و خروجیها باشد .



موقعیت خاموش کننده های آتش باید تزدیک یه دی خروجی بوده و بدون هرگونه مانع باشد .

- ۷ در مکانی نصب شود که امکان صدمات فیزیکی را به حداقل برساند .
- ۸ بلا فاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آنها را شارژ نمود .
- ۹ کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها باید قفل شود .
- ۱۰ مسیر دسترسی کوتاه و خالی از وسائل دست و پا گیر و مزاحم باشد .
- ۱۱ در فضای باز ، سیلدر نباید در مقابل تابش مستقیم نور خورشید یا برف و باران قرار گیرد .
- ۱۲ باید دقیق کرد که خاموش کننده در فاصله ای دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شوند .

خاموش کننده های دستی :

خاموش کننده های دستی به پنج گروه تقسیم می شوند :

- \* خاموش کننده های محتوی کف
- \* خاموش کننده محتوی آب
- \* خاموش کننده محتوی گاز CO<sub>2</sub>
- \* خاموش کننده محتوی مواد هالوژنه
- \* خاموش کننده محتوی پودر شیمیایی

از نظر کاربرد خاموش کننده ها را می توان مطابق جدول زیر تقسیم نمود :

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

الکترویسیته	گازها	مایعات قابل اشتعال	آتش سوزی مواد خشک	موثر*	بسیار موثر***
			کننده		
-	-	-	****	***	آب
-	-	****	***	**	کف
*	**	**	**	*	پودر
***	-	**	-	-	CO <sub>2</sub> گاز
***	-	**	**	*	مواد هالوژنه

توجه : جهت اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال از پودر خشک شیمیایی استفاده می شود در آشپزخانه ، موزه ها ، گالری های نقاشی از خاموش کننده های CO<sub>2</sub> استفاده می شود .

### (۲) گازهای فشرده :



بدلیل اینکه بعضی از گازها ای فشرده قابل اشتعال بوده و همگی آنها تحت فشار می باشند . باید با نهایت احتیاط نگهداری و مورد استفاده قرار گیرند . انفجار یک کپسول گاز می تواند اثرات محرابی بهمراه داشته باشد .

گازهای فشرده ای که در بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرند شامل : گازهای بیهوشی آور ، اکسید اتیلن ، اکسیژن ، دی اکسید کربن می باشد . هرچند که اکسیژن و اکسید ازت بعنوان گازهای غیر قابل اشتعال علامت گذاری شده اند اما در حقیقت گازهای اکسید کننده ای می باشند که به روند سوختن کمک می نمایند .

#### احتیاط های عمومی برای نگهداری و استفاده از کپسولهای گاز فشرده :

- \* هیچ گاه یک نوع کپسول در مجاورت کپسولی از نوع دیگر قرار نگیرد .

- \* در مکانی که این کپسولها مورد استفاده قرار می گیرند به هیچ وجه دخانیات استعمال نشود .

- \* هیچ گاه کپسولها روی زمین کشیده یا غلطانده نشوند . به منظور حمل و نقل آنها باید از تراپری دستی استفاده نمود .

- \* هیچ گاه کپسول خالی در کنار کپسول پر شده نباید قرار گیرد .

- \* هیچ گونه شعله یا جرقه ای نباید با کپسول تماس یابد .

- \* هیچ گاه کپسول نباید در مجاورت الکترویسیته قرار گیرد .

- \* هیچ گاه کپسولهای حاوی گازهای قابل اشتعال در مجاورت کپسولهای حاوی گازهای غیر قابل اشتعال قرار نگیرد .

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

### **(۳) دستگاهها و تجهیزات نا ایمن :**

دستگاهها و تجهیزاتی که اتصال به زمین نداشته و یا این اتصال به درستی انجام نشده باشد از عوامل ایجاد حریق می باشد و شامل موارد زیر هستند:

- \* اتصال سیم های دو شاخه به پریزهای سه راه
- \* سیم های اتصال به زمینی که بریده شده یا خم شده اند .
- \* وسایل و تجهیزاتی که روی سطوح فلزی مستقر شده اند .
- \* سیم هایی که به دو شاخه یا سه شاخه خود بدرستی محکم و متصل نشده اند .
- \* سیم هایی که اتصال به زمین نشده اند و در ایستگاههای پرستاری به وفور یافت می شوند .
- \* وسایل برقی افراد مانند رادیوها ، قهوه سازها ، فن ها ، وسایل گرمایشی برقی که توسط کارکنان به محیط کاریشان آورده شده است و اتصال به زمین نشده اند یا اتصال به زمین آنها ضعیف و ناقص بوده است و دارای سیم ها و کابل های فرسوده می باشند .

### **(۴) بریدگی ولاسیراسیون دست :**



آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده می تواند منجر به بریدگی ولاسیراسیون دست شود و در اصطلاح آن را « نیدل استیک » می گویند و مهم ترین خطر بیولوژیکی برای کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می آید . پیامد بیولوژیکی این آسیبها ، می تواند زمینه ساز انتقال بیماری هایی مثل ایدز ، هپاتیت ب و ث گردد .

احتیاطات ایمنی جهت مراقبت از نیدل استیک شدن :

- استفاده شده را فورا درون safe Box دفع نمایید .
- از سرپوش گذاری مجدد سرسوزن (Recap) اجتناب کنید .
- اگر ناگزیر به درپوش گذاری هستید از تکنیک یک دستی به شرح ذیل استفاده نمایید .
  - سرپوش را روی میز بگذارید .
  - سرنگ و سرسوزن را در یک دست بگیرید .
  - بدون استفاده از دست دیگر داخل سرپوشی که روی میز گذاشته اید قرار دهید .

### **نکات بهداشتی در بخش دیالیز :**

#### **(۱) مسائل مربوط به محیط بخش دیالیز :**

- ✓ بعد از دیالیز هر بیمار تخت ، صندلی و سطح خارجی ماشین دیالیز تمیز گردیده و ضد عفونی صورت گیرد .
- ✓ تمام ملافه ها برای هر بیمار در هر روز عوض گردد .
- ✓ وسایل بعد از استفاده برای هر بیمار پاک گردیده و ضد عفونی گردد . و قطرات خون بلا فاصله تمیز شده و محل آن ضد عفونی گردد .
- ✓ رسنل خدماتی واحد دیالیز بایستی بلا فاصله آلودگی ها و زباله های عفونی را بردارند .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- ✓ تمام لوازم مصرف شده یکبار مصرف بایستی در کیسه غیر قابل نفوذ جمع آوری شده و دفع گردند . کلیه زباله ها در بخش دیالیز عفونی تلقی می شود.
- ✓ اجسام نوک تیز در Safety Box بلافصله بعد از استفاده ریخته شوند .

### ۲) مسایل مربوط به پرسنل بخش بخش دیالیز :

#### ➤ در موارد زیر دست ها بایستی شسته شوند :

- قبل و بعد از کار کردن با ماشین دیالیز
- قبل و بعد از اجرای یک اقدام غیر مهاجم
- بعد از درآوردن دستکش ها
- در صورت کثیف شدن دست ها
- بعد از ترک محل یک بیمار و تماس با بیمار بعدی

#### ➤ در موارد زیر دست ها باید با مواد آسپتیک ضد عفونی گردند:

- قبل از اجرای یک اقدام تهاجمی نظیر کاتتر وریدی ، Circulatory access و کاتتر صفاقی.
- قبل و بعد از وصل کردن بیمار به دستگاه دیالیز

#### ➤ موارد استفاده از دستکش :

- در موارد تمیز کردن دستگاه دیالیز و تمیز و ضد عفونی کردن وسایل یا محیط و یا انجام سایر اقدامات غیر تهاجمی از دستکش غیر استریل یکبار مصرف استفاده کنید.
- به هنگام انجام اقدامات تهاجمی یا استفاده از دستگاه دیالیز جهت بیماران از دستکش استریل استفاده کنید.
- از گان یا اپرون ضد آب به هنگام ارائه خدمات در بین بیماران استفاده کنید.

### سایر نکات مربوط ایمنی بهداشتی دیالیز :

- ❖ به هنگام اقداماتی که احتمال پخش خون و یا مواد خونی وجود دارد باید از محافظت صورت ، عینک و ماسک استفاده کنید.
- ❖ در صورت کار مداوم در بخش دیالیز از گان و لباس اسکراب استفاده نموده و در پایان روز تعویض نماید .
- ❖ توجه ویژه در جایه حایی وسایل نوک تیز به منظور پیشگیری از آسیب سرسوزن داشته باشد .
- ❖ پرسنل بیمارستان از سیگار کشیدن ، خوردن و آشامیدن در داخل بخش و اتاق درمان و یا آزمایشگاه خودداری کنند .

### وسایل حفاظت فردی بخش دیالیز :

لباس کار ، دستکش ، لاتکس ، کفش روبسته ، ماسک یک بار مصرف ، دستکش یک بار مصرف



## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

# کنترل عفونت



### عفونتهای بیمارستانی

عفونتهای اکتسابی از بیمارستان به عفونتهایی اطلاق می‌گردد که حداقل ۷۲ ساعت پس از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شوند و در زمان پذیرش، فرد نباید علائم آشکار عفونت را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود نیز نباشد.

- تب
- تغییر زخم جراحی به نفع عفونت
- تشخیص پزشک مبنی بر عفونت بیمارستانی
- تغییر آنتی بیوتیک
- شروع آنتی بیوتیک جدید

از علائم و نشانه‌های ابتلاء به عفونت بیمارستانی می‌باشند و باید به پرستار کنترل عفونت گزارش شوند. عفونت بیمارستانی باعث افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان بستری و بهبودی، ناتوانی و مرگ بیماران می‌شود. هدف نهایی ما پایش و جمع آوری ۴ عفونت بیمارستانی شامل: عفونت‌های ادراری، زخم جراحی، تنفسی و خونی است.

### چه علائمی ما را مشکوک به عفونت بیمارستانی می‌کند؟

#### عفونت ادراری

تب، تکرر ادراری، سوزش ادراری، درد فوق عانه با لمس این ناحیه، فوریت ادراری، پیوری، کشت ادراری مثبت، تشخیص بالینی پزشک و شروع درمان آنتی بیوتیکی. در بیماران زیر یک سال:

هیپوترمی، آپنه، برادی کاردی، نارامی در موقع ادرار کردن، بی حالی، استفراغ

# **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

## عفونت محل جراحی

ترشح چرکی از محل برش جراحی یا آبسه ، جداسازی ارگانیزم از مایع یا بافت محل برش ، وجود علائم: حساسیت و دردناکی، ورم موضعی، قرمزی یا گرمی، تب پزشک عمده زخم را باز کرده باشد.

## پنومونی

سمع رال ، شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط ، کشت راه هوایی (تراشه/تراک) مثبت ، وجود انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده، وجود حفره یا افیوزن پلور در بیماری که حداکثر یک سال سن دارد: آپنه، تاکیکارדי، برادیکارדי، خس خس کردن سینه، سرفه ویا وجود رونکای

## عفونت خون

رشد پاتوژن در کشت خون ، تب(دمای بالای ۳۸ درجه سانتی گراد)، لرز یا هیپوتانسیون(فسار سیستولیک کمتر از ۹۰ ) ، اولیگوری ، شروع درمان سپسیس توسط پزشک در کودکان زیر یکسال: تب، هیپوترمی، آپنه، برادی کاردي

## تعریف عفونت :

فرآیندی که در آن عامل بیماری زا (عفونی) به میزبان حساس حمله کرده ، رشد و تکثیر یافته و باعث آسیب رساندن به میزبان می شود . عوامل عفونی مهم عبارتند از : ویروس ها ، باکتری ها ، ریکتزیها ، قارچ ها و انگل ها .

## کلونیزاسیون :

کلونیزاسیون به معنای رشد و تکثیر عامل عفونی ( میکرووارگانیسم) در میزبان بدون ایجاد عفونت می باشد . بیماران یا کارکنان مشاغل پزشکی می توانند با پاتوژنهای مختلفی کلونیزه شوند ولی علائم عفونت را بروز ندهند .

## ناقل :

افرادی که کلونیزاسیون آنها با میکرووارگانیسم ها می توانند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شود . بطور مثال تعداد زیادی از افراد با میکروب استاف اورئوس کلونیزه شده اند بدون اینکه بیمار شوند به این افراد ناقل می گویند.

## ایزو لاسیون یا جداسازی بیماران در بیمارستان :

هدف از جداسازی بیماران در بیمارستان ، جلوگیری از انتقال میکرووارگانیسم ها از بیماران ( چه مبتلا به عفونت و چه کلونیزه با عفونت ) به سایر بیماران ، عیادت کنندگان و پرسنل پزشکی می باشد . اصول جداسازی مشتمل بر دو قسمت می باشد "احتیاطات استاندارد " و "احتیاطات بر اساس راه انتقال بیماری " .

## احتیاطات استاندارد STANDARD PRECAUTIONS

احتیاطات استاندارد ، احتیاطات معمول کنترل عفونت می باشد. رعایت این احتیاطات برای تمام بیماران ضروری است. این احتیاطات برای به حداقل رساندن انتشار عفونت حین ارائه مراقبت و برای دوری جستن از تماس مستقیم با خون ، مایعات ، ترشحات بدن ، پوست خراشیده و یا جراحت طراحی شده اند و باید بعنوان یک اولویت در کلیه مراکز بهداشتی درمانی در نظر گرفته شوند .

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## احتیاطات استاندارد بطور خلاصه شامل:

### الف - بهداشت دست

بهداشت دست بطور معمول شامل شستن با آب و صابون و یا ضدعفونی دست با استفاده از مواد حاوی الکل است که برای پیشگیری از انتقال میکروارگانیسمها به دهان ، بینی و ملتحمه چشم ، و همچنین پیشگیری از انتقال میکروارگانیسمها به بیماران دیگر و محیط ضروری است .

دستها باید در صورت وجود آلودگی قابل مشاهده ، با آب و صابون ساده یا مواد حاوی مواد ضد میکروبی شسته شود . بعد از هر بار تماس دست با دستکش یا بدون دستکش با خون ، مایعات و ترشحات بدن ، و اجسام آلوده باید دستها شسته شود . دستها باید بلافصله بعد از خارج کردن دستکش از دست ، بین مراقبت از بیماران ، و هر زمانی که احتمال انتقال میکروارگانیسمها وجود دارد ، شسته شود . گاهی ضروری است بین هر بار انجام مراقبت برای یک بیمار خاص نیز دستها شسته یا ضدعفونی شوند تا از انتقال میکروارگانیسمها به قسمتهای دیگر بدن بیمار جلوگیری گردد .

### ب - انتخاب وسائل حفاظت فردی بر اساس ارزیابی خطر

با توجه به خطر آلودگی و تماس البسه و پوست کارکنان با خون ، مایعات و سایر ترشحات بدن استفاده از وسائل حفاظت فردی ضروری است .

• **دستکش :** هنگام تماس با خون ، مایعات و ترشحات بدن ، غشاها مخاطی ، پوست آسیب دیده ، و یا اجسام آلوده باید دستکش تمیز ولی غیر استریل پوشید . دستکش ها را باید بین هر بار انجام مراقبت از بیماران تعویض نمود . پس از استفاده از دستکش و پیش از ارائه مراقبت به بیمار دیگر ، باید آنها را خارج و بلافصله دستها را شست تا از انتقال میکروارگانیسمها به محیط یا سایر بیماران جلوگیری شود .

• **ماسک :** برای حفاظت از غشای مخاطی بینی و دهان طی انجام مداخلاتی که احتمال پاشیدن خون و ترشحات بدن وجود دارد ، لازم است از ماسک استفاده شود . هنگامی که ماسک مرطوب شد باید تعویض شود . ماسک هرگز به گردن آویزان نشود .

ماسک ها شامل ماسک ساده یا جراحی که در هنگام مراقبت از بیمار مبتلا به بیماری منتقله از راه قطرات و یا به عنوان بخشی از محافظت طی فعالیتهای مراقبت از بیمار که احتمال پاشیدن خون ، ترشحات یا مایعات بدن وجود دارد ، استفاده می شود . این ماسکها حفاظت کامل را در برابر آئرسولهای ناشی از ذره ایجاد نمی کنند . و ماسک تنفسی مخصوص ( N ۹۵ ) برای محافظت فرد از ذرات ریز تنفسی ( آئرسولها ) می باشد . مثل آلودگی با ویروس آنفلوآنزا ای پرندگان . محکم نمودن و استفاده درست از ماسک تنفسی مخصوص برای اطمینان از عملکرد صحیح آن ضروری است .

• **گان :** برای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباسها طی انجام مداخلاتی که احتمال پاشیده شدن خون یا ترشحات بدن وجود دارد ، باید از گان تمیز و غیر استریل استفاده کرد .

• **حفاظت از چشم / محافظت صورت :** صرف نظر از تشخیص بیماری ، زمانی که خطر آلودگی چشمها و ملتحمه با پاشیده شدن خون یا مایعات بدن وجود دارد باید از عینک استفاده شود .

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

استفاده از محافظه چشم براساس ارزیابی وضعیت بیمار در زمان مراقبت ، تعیین می شود .

- همیشه در هنگام انجام مداخلات تولید کننده آتروسل از محافظه چشم استفاده شود .

- هنگام ارائه مراقبت و در تماس نزدیک با بیماری که دچار علائم حاد تنفسی است . ( مانند سرفه و عطسه ) ، و در زمانی که احتمال پاشیدن ترشحات وجود دارد وهمچنین هنگام کار در فاصله یک متری و یا کمتر با بیماری که بیماری حاد تنفسی دارد ، باید از محافظه چشم استفاده شود .

حافظت از چشم می تواند با وسائل زیر صورت گیرد :

- محافظه صورت

- کلاه ایمنی با محافظه صورت

- عینک ایمنی

### **• حفاظت از پاهای اگرچه معمولاً حفاظت از پاهای در احتیاطات استاندارد وجود ندارد ، اما برای حفاظت کارکنان امر**

مهمی محسوب می شود . کارکنان هنگام کار باید کفشها را بپوشند که نسبت به مایعات نفوذ ناپذیر باشد و کاملاً تمام

سطح پاهای را قرار گیرد ( صندل یا دمپایی نباشد ) .

نکات مورد توجه در استفاده از وسائل حفاظت فردی :

• احتمال عفونت را کاهش میدهد ولی این احتمال را کامل از بین نمی برند .

• فقط در صورتی که درست استفاده شوند موثرند .

• جایگزین اصلی ترین جزء کنترل عفونت ( شستن دست ) نمی شوند .

ترتیب پوشیدن وسائل حفاظت فردی :

• شستن دست

• پوشیدن گان

• پوشیدن کلاه یا محافظه موهای سر

• پوشیدن ماسک

• پوشیدن محافظه صورت یا عینک

• پوشیدن دستکش

ترتیب خارج کردن وسائل حفاظت فردی :

• در آوردن دستکش

• درآوردن گان

• شستن دست

• در آوردن عینک یا محافظه صورت

• در آوردن کلاه یا محافظه مو

• در آوردن ماسک

• شستن دست

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

**ج - کاربرد مناسب تجهیزات مراقبت بیمار و کیسه های حاوی زباله :** لوازمی که برای مراقبت از بیمار مصرف شده و با خون ، مایعات بدن و ترشحات یا مواد دفعی آلوده شده اند، باید به نحوی جمع آوری شوند که از مواجهه پوست و مخاط با آنها ، آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسمها به سایر بیماران و محیط جلوگیری به عمل آید . لوازمی که مجدداً قابل مصرف هستند (چند بار مصرف ) باید قبل از مصرف شدن برای بیمار دیگر به شکل مناسب نظافت شوند . وسائل یکبار مصرف باید به صورت مناسب معذوم شوند .

**د - پیشگیری از needle stick و جراحات پوستی :** در زمان جمع آوری وسائل نوک تیز ( بعد از انجام پروسیجر ) ، باید مراقب بود تا آسیبی به کسی وارد نشود . هرگز دربوش سوزنهای مصرف شده را مجدداً به روی سوزن قرار ندهید یا آنها را دستکاری نکنید ( به هیچ وجه نباید نوک سوزن بطرف بدن شما قرار گیرد ) . با دست خود سوزن مصرف شده را از سرنگ یکبار مصرف جدا یا خم نکنید ، آن را نشکنید یا دستکاری ننمایید . سرنگهای یکبار مصرف و سوزنهای اسکالپ و سایر وسائل نوک تیز مصرف شده را در ظروف مناسب و مقاوم به سوراخ شدگی ( در حد امکان این ظروف به محلی که وسائل فوق مورد استفاده واقع می شوند نزدیک باشند ) قرار دهید .

**ه - نظافت صحیح محیط :** بیمارستان باید برنامه‌ی روزانه و منظمی برای تمیز و ضد عفونی نمودن سطوح محیطی ، تجهیزات و کلیه سطوح آلوده داشته باشد .

**و - نحوه مواجهه صحیح با پسماندها :** پسماند های تولید شده در بیمارستان به دو دسته عمده تقسیم می شوند : پسماندهای شبه خانگی ( عادی ) و پسماندهای خطرناک پزشکی که خود به ۹ دسته تقسیم می شود زباله های شبهه خانگی در کیسه های مشکی ، زباله های عفونی شامل تمامی پسماندهای مرتبط به بیمار در کیسه های مشکی و پسماندهای نوک تیز و برندۀ شامل سرسوزن ، تیغ بیستوری و اسکالپ ، لاست ، ویالهای شکسته آنزیوکت ، و هرگونه وسیله یکبار مصرف تیز و برندۀ که در تشخیص و درمان و مراقبت بیماران استفاده شده است . صرف نظر از این که آلودگی داشته یا نداشته باشد ، در سفتی باکس جمع آوری گردد .

### **۲- احتیاط هایی بر اساس راه انتقال بیماری : Transmission – Based Precautions**

این نوع احتیاط ها باید برای بیمارانی در نظر گرفته شوند که دچار سندرم بالینی مشکوک یا قطعی ، تشخیص بیماری خاص ، کلونیزاسیون یا عفونت با ارگانیسم مهم از لحاظ اصول همه گیر شناسی شده اند . ذکر این نکته ضروری است که رعایت این نوع احتیاط ها باید با رعایت اصول احتیاط های استاندارد توأم گردد .

### **۳- احتیاط های هوایی : Airborne precautions**

برای جلوگیری از انتقال بیماری هایی که از طریق هسته قطرات با اندازه کوچکتر از ۵ میکرون یا ذرات گرد و غبار حاوی عامل عفونی بکار میروند .

**اصول احتیاط های هوایی عبارتند از :**

- ۱- بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار هوای منفی کنترل شده وحد اقل ۶ بار تعویض هوا در ساعت باید صورت گیرد .
- ۲- بستن درب اتاق بیمار .
- ۳- خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد نه داخل بخش .

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

- ٤- در صورت امکان می توان دو بیمار با بیماری یکسان را در یک اتاق بسته کرد.
- ٥- اقدامات احتیاطی را برای بیمار و خانواده وی توضیح دهید .
- ٦- تمام افرادی که وارد اتاق می شوند باید از رسپیراتور شخصی که فیلتر یک میکرومتری داشته و حداقل کار آبی استفاده نمایند.) ماسک ٩٥
- ٧- به بیمار آموزش دهید هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با دستمال بپوشاند.
- ٨- یک کیسه در کنار تخت بیمار در نظر بگیرید که بیمار دستمال های آلوده را داخل آن بیندازد.
- ٩- جایه جایی بیمار باید محدود گردد و قبلاً از ترک اتاق بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد.

**توجه :**

- بیماران مبتلا به سل که تحت درمان موثر ضد سل هستند و از لحاظ بالینی در حال بهبودی میباشند ( سه نمونه اسمری خلط پشت سر هم در روز های مجزا از لحاظ باسیل اسید فاست منفی باشد) میتوانند از ایزولاسیون خارج شوند.
- توصیه می شود در بیماران چهار سل شدید همراه با ایجاد حفره سرفه مداوم یا سل حنجره و احتمالاً کسانی که به محیط های دارای افراد پر خطر بر می گردند (مانند اطفال بیماران چهار سرکوب دستگاه ایمنی) جدا سازی حداقل تا یک ماه صورت میگیرد .
- بیماران چهار سل مقاوم به چند دارو ( MDR ) باید در طول مدت بسته در بیمارستان از سایر بیماران جدا شوند بیماری هایی که رعایت احتیاط هوایی برای آنها ضرورت دارد ( مشکوک به عفونت یا عفونت قطعی و اثبات شده ) عبارتند از : سل ریه یا حنجره ، سرخک ، آبله مرغان یا زونای منتشر .

### **۱۱. احتیاط قطرات Droplet P.**

برای جلوگیری از انتقال آنروسل های درشت (قطره) از این نوع احتیاط استفاده میشود بدلیل اندازه بزرگ این قطرات ( بیش از ٥ میکرون ) در هوا معلق نمی مانند و تا فاصله زیاد حرکت نمی کنند . این ذرات حین صحبت، عطسه یا سرفه کردن ، یا در حین ساکشن یا برونکوسکوپی ایجاد می شوند .

**اصول رعایت احتیاط قطرات عبارتند از :**

- ١- در صورت امکان بیمار را در اتاق مجزا با سرویس دستشویی جدا قرار دهید.
- ٢- دو بیمار با یک بیماری مشترک را می توان در یک اتاق قرار داد .
- ٣- روش ایزوله را برای بیمار و خانواده وی توضیح دهید.
- ٤- برای اطلاع دیگر افراد کارت "احتیاطات ریز قطرات" را روی در اتاق نصب نمایید.
- ٥- قبل از ورود به اتاق و پس از ترک اتاق دستهای خود را بشویید .
- ٦- در صورت کار کردن پرسنل در فاصله یک متری بیمار باید از ماسک استفاده گردد .
- ٧- ماسک را به طور مناسب و با استفاده از فلز قابل انعطاف روی دهان و بینی محکم نمایید.
- ٨- قبل از برداشتن ماسک ابتدا دستکش ها را درآورده و دست های خود را بشویید .
- ٩- به بیمار آموزش دهید که دهان و بینی خود را هنگام عطسه و سرفه با دستمال کاغذی بپوشاند .
- ١٠- یک کیسه ای پلاستیکی نزدیک تخت بیمار قرار دهید تا دستمال های آلوده خود را در آن قرار دهد.

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

- ۱۱- اطمینان یابید که تمام ملاقاتی ها از ماسک استفاده می کنند.
- ۱۲- در صورت انتقال و جای بیمار به خارج از اتاق ایزوله، بیمار باید از ماسک استفاده نماید .
- ۱۳- استفاده از گان و دستکش تابع اصول احتیاطات استاندارد است.
- ۱۴- درب اتاق می تواند باز بماند (بدلیل جای بیمار کم ذرات در حدود یک متر).

برای عفونتهایی مانند باکتری هموفیلوس آنفلوانزای نوع B مهاجم، مننگوکوک، بیماری پنوموکوک مقاوم به چند دارو، سیاه سرفه، ویروس آنفلوانزا، فارثیت، اوریون، سرخچه رعایت احتیاطات قطرات ضروری است.

### **III. احتیاط تماسی : Contact P.**

برای جلوگیری از انتقال ارگانیسم های مهم از لحاظ همه گیر شناسی که مربوط به بیماران کلونیزه یا دچار عفونت بوده و از طریق تماس مستقیم (لمس کردن بیمار) یا تماس غیر مستقیم (تماس با اشیاء و وسایل یا سطوح آلوده محیط بیمار) انتقال می یابند رعایت احتیاط تماسی توصیه می شود. اصول احتیاط های تماسی عبارتند از :

- ۱- بیمار را در اتاق مجزا با سرویس جداگانه قرار دهید.
- ۲- می توان دو بیمار با بیماری مشترک را در یک اتاق قرار داد .
- ۳- روش ایزوله را برای بیمار و خانواده وی توضیح دهید .
- ۴- کارت "احتیاط تماسی" را روی درب نصب کنید .
- ۵- استفاده از وسائل محافظت شخصی شامل پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق، در آوردن دستکش قبل از ترک اتاق
- ۶- رفع آلودگی دستها با یک ماده طبی شوینده دست یا ماده حاوی الكل بلا فاصله پس از در آوردن دستکش.
- ۷- جلوگیری از آلودگی مجدد دستها قبل از ترک اتاق.
- ۸- استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل ملاحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار و یا در صورت افزایش خطر تماس با مواد بالقوه عفونی بیمار.
- ۹- قبل از ترک اتاق ایزوله گان باید در آورده شود.
- ۱۰- وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار (گوشی، دستگاه فشارسنج) باید در اتاق ایزوله بمانند و برای سایر بیماران مورد استفاده قرار نگیرد در صورت لزوم استفاده از این وسایل باید آنها را ابتدا پاک و گندزدایی نموده و سپس مورد استفاده قرار داد.
- ۱۱- انتقال و جای بیمار به خارج از اتاق ایزوله باید به حداقل ممکن برسد.

در موارد زیر رعایت احتیاطات تماسی ضرورت دارد :

- ✓ بیماران دچار عفونت یا کلونیزه با باکتری های مقاوم به چند دارو .
- ✓ عفونتهای منتقله از راه مدفوعی - دهانی
- ✓ بیماری های اسهالی حاد که احتمالاً دارای منشاء عفونی هستند .
- ✓ عفونتهای پوستی که بشدت مسری هستند مانند زردزخم ، سلولیت یا آپسه بزرگ یا زخم بستر .
- ✓ شپش
- ✓ گال

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

✓ کونزکتیویت ویروسی

✓ زونا

عفونت های که رعایت احتیاط برای انها بر اساس راه انتقال صورت می گیرد

احتیاط تماسی	احتیاط قطرات	احتیاط هوایی
آبسه ای که پانسمان نشده یا ترشح آن کنترل نمی شود	آدنو ویروس در نوزادان یا اطفال	سرخ
آدنو ویروس در نوزادان یا اطفال	دیفتری حلقی	سل ریه یا حنجره
سلولیتی که ترشح آن کنترل نمی شود	منزیت یا اپی گلوتیت ناشی از همو فیلوس آنفلوانزا	سندرم تنفسی - حاد شدید
اسهال با عامل کلستریدیوم دیفیسیل	پنومونی ناشی از همو فیلوس آنفلو انزا در اطفال و نوزادن	آبله
کونزکتیویت حاد ویروسی	ویروس آنفلوانزا	آبله مرغان
زخم بستر عفونی و عدم کنترل ترشح آن	عفونت های مننگوکوکی	تب های خونریزی دهنده ویروسی
عفونت ناشی از شیگلا، انتریت با یرسینیا انتروکلیتیکا، روتاوریوس، هپاتیت A	اوریون	زونا (نوع منتشر یا در بیمار نقص ایمنی)
کولیت ناشی از <i>E. coli</i> در بیمارانی که از پوشک استفاده می کنند و بی اختیاری دارند.	مايكو پلاسمما پنومونیه	بشورات تاولی
عفونت های آنترو ویروسی در نوزادان یا اطفال	پارو ویروس 19 B	بشورات ماکولی پاپولی همراه با آبریزش بینی و تب
ویروس هرپس سیمپلکس در نوزادان نوع منتشر یا جلدی مخاطی شدید اولیه	سیاه سرفه	سرفه، تب و ارتash ریوی در لوب فوقاری ریه
زرد زخم	پنومونی ناشی از طاعون (طاعون ریوی)	سرفه، تب و ارتash ریوی در فرد دچار عفونت HIV
شیش	سرخجه	تب، علایم تنفسی در فردی که اخیرا تماس با بیمار مبتلا به سندرم حاد شدید تنفسی داشته یا مسافرت اخیر به منطقه ای که SARS در آنجا منتقل می شود
باکتری های مقاوم به چند دارو استرپتوکوک (گروه A) در نوزادان یا اطفال خرد سال	فارنژیت یا پنومونی یا محملک با عامل	
عفونت پارآنفلوانزا در اطفال و نوزادان	دیفتری جلدی	

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

سرخچه مادر زادی	منزهیت	
گال	پتشی یا اکیموز همراه با تب	
(SARS) سندرم تنفسی شدید حاد	سرفه حمله ای یا شدید مداوم در دوره فعالیت بیماری	
	سیاه سرفه	
احتیاط تماسی	احتیاط قطرات	احتیاط هوایی
عفونت عمدۀ پوست زخم یا سوختگی با عامل استافیلوکوک ارئوس یا استرپتوکوک گروه A		
آبله و آبله مرغان		
تب های خونریزی دهنده و پرسوسی		
زونا ی نوع منتشر یا در بیمار نقص ایمنی		
اسهال حاد با عامل احتمالی عفونی در بیمار دچار بی اختیاری		
اسهال در فردی که اخیراً آنتی بیوتیک استفاده کرده		
عفونت های تنفسی در نوزادان و اطفال کم سن		
سابقه عفونت یا کلونیزه با میکروب های مقاوم به چند دارو		
عفونت پوست زخم یا دستگاه ادراری در بیماری که اخیراً در بیمارستان یا در آسایشگاه سالماندان بستری شده به دلیل ارگانیسم های مقاوم به چند دارو		
تب علایم تنفسی در فردی که اخیراً در تماس با بیمار مبتلا به SARS بوده یا به نواحی که SARS در انجا رخ می دهد اخیراً مسافرت کرده است		
برای بعضی عفونت ها رعایت بیش از یک نوع احتیاط ضروری است		

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## تشکیل پرونده بهداشتی و واکسیناسیون کارکنان بیمارستان

به منظور پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی پرسنل شاغل در بیمارستان پرونده بهداشتی دارند و خلاصه معاینات ، سوابق و بویژه واکسیناسیون در آن ثبت می شود .

### سابقه واکسیناسیون :

**واکسن هپاتیت B :** واکسیناسیون گروههای پرخطر برای ایمن سازی هپاتیت B به شرح زیر می باشد :

کلیه پرسنل شاغل در مراکز درمانی بسترهای سرپایی که با خون و ترشحات آغشته به خون به نحوی در تماس هستند شامل : پزشکان ، پرستاران ، کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه ، بهیاران ، نظافتچیان واحدهای بهداشتی و آزمایشگاه ، دانشجویان پزشکی ، پرستاری و.....

ایمن سازی علیه بیماری هپاتیت B برای گروههای پرخطر در سه نوبت ۰ و ۱ و ۶ تزریق می گردد و ۲ تا ۳ ماه پس از پایان واکسیناسیون انجام سرولوژی HBSAb جهت اطمینان از پاسخ ایمنی لازم است .

- چنانچه فردی از این گروه سه ماه پس از دریافت آخرین نوبت واکسن هپاتیت B سطح آنتی بادی خود را بررسی و تیتر آنتی بادی وی بیش از  $10 \text{ IU/ml}$  باشد نیازی به دوز بوستر ندارد و چنانچه میزان آنتی بادی زیر این مقدار باشد لازم است مجددا سه نوبت واکسن هپاتیت B با دوز معمولی را دریافت نماید .

- چنانچه فردی در گذشته دور واکسن هپاتیت B دریافت نموده ( بیش از سه ماه ) پس از بررسی سطح آنتی بادی ، با توجه به نتایج به شرح ذیل اقدام گردد :

- چنانچه تیتر آنتی بادی وی بیش از ۱۰ باشد ، نیازی به دوز یاد آور ندارد .

- چنانچه تیتر آنتی بادی این فرد کمتر از ۱۰ باشد یک نوبت دوز یادآور دریافت می نماید و حداقل دو هفته بعد سطح آنتی بادی مجدداً کنترل شده و در صورتیکه تیتر پایین تراز  $10 \text{ IU/ml}$  باشد دو نوبت دیگر واکسن را هم دریافت نماید .

**واکسن توام ( دیفتربی ، کزار ) :** ایمن سازی علیه دیفتربی و کزار بدون سابقه ایمن سازی بصورت ۰ و ۱ و ۶ و ۱۲ ماه می باشد و سپس هر ده سال یکبار تکرار شود .

**آنفلوآنزا :** براساس آخرین سوهای غالب بصورت سالیانه تعیین می گردد سیاست واکسیناسیون و گروه هدف هر ساله توسط مرکز مدیریت بیماری ها تعیین و ابلاغ می گردد .

**منثریت :** هر دو سال یک بار تزریق شود .

### مواجهه شغلی

#### تعريف مواجهه :

مواجهه ای که ممکن است کارکنان مراقبت بهداشتی ( HCP( Health Care Personal) HIV/ HBV/ HCV قرار دهد یعنی تماس خون، بافت یا سایر مایعات بالقوه عفونی بدن از طریق فرورفتن سوزن در پوست یا بریدگی با شیء تیز یا تماس این مواد با غشای مخاطی یا پوست آسیب دیده ( مانند پوست ترک خورده ، خراشیده شده یا مبتلا به درماتیت )

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## مایعات بالقوه عفونت زا :

خون مهمترین مایع بدن است که می تواند عفونت زا باشد و پس از آن مایع مغزی - نخاعی ، مایع سینوویال ، مایع پلور ، مایع صفاقی ، مایع پریکارد و مایع آمینوتیک میزان خطر انتقال عفونت HIV / HBV / HCV از این مایعات مشخص نمی باشد .

ادرار ، بزاق ، خلط ، مدفع ، مواد استفراغی ، ترشحات بینی ، اشک و عرق عفونت زا نیستند ، مگر اینکه خون در آنها مشاهده شود  
**محافظت نخستین اقدام پیشگیری است !** کارکنان مراقبت بهداشتی باید اقدامات احتیاطات استاندارد را به کار برد .

( شستن دستها ، استفاده از وسائل حفاظت فردی ، دفع اجسام تیز و برنده در سفتی باکس ، عدم سرپوش گذاری مجدد سوزنها ، واکسیناسیون کامل هپاتیت B و اطمینان از پاسخ ایمنی بدن )

## کمک های اولیه فوری :

۱- در اولین فرصت ، محل مواجهه با مایعات بالقوه عفونی را با استفاده از آب معمولی و صابون شستشو دهید .

• غشاها مواجهه غیر چشم مواجهه یافته را با آب معمولی و فراوان شستشو دهید .

• چشم مواجهه یافته را با محلول نرمال سالین یا آب سالم فراوان شستشو دهید .

۲- از هر گونه دستکاری و فشردن محل مواجهه خودداری نمایید .

• از مواد گندزدا یا ضد عفونی کننده که می توانند باعث ایجاد سوزانندگی و التهاب شوند استفاده نکنید

۳- موضوع را به واحد کنترل عفونت جهت ثبت و پیگیری اطلاع دهید .

۴- در صورت مشخص بودن منبع مواجهه ( بیمار ) نمونه جهت بررسی HIV Ab.HCV Ab.HBSAg گرفته شود .

## ارزیابی مواجهه :

در صورت منفی بودن منبع مواجهه از نظر HBS ، HCV ، HIV تجویز رژیم پیشگیری و یا پیگیری بعدی ضرورت ندارد . در صورتیکه وضعیت فرد مواجهه یافته از نظر HBS ، HCV ، HIV مشخص نیست آزمایش پایه برای Ag ، Ab titer ، HBsAg در اسرع وقت در خواست شود .

## دستوراً لعمل رعایت بهداشت دست در مرآکز بهداشتی درمانی

### بنظور پیشگیری از انتقال عفونتهاي بيمارستانى

رعایت بهداشت دست Hand Hygiene به عنوان اساسی ترین موازین و یکی از اولیه ترین تمهیدات در کاهش عفونتهاي بيمارستانى و گسترش مقاومت ضد ميكروبى و افزايش ايماني بيماران محسوب می شود .

### موارد شستن دست با آب و صابون در موارد ذيل بصورت اكيد توصيه می شود :

• دستها بصورت آشكارا كشيف باشد .

• دستها بصورت مشهود آلدده به مواد پروتئيني نظير خون و ياساير مایعات بدن باشد .

• دستها در معرض تماس احتمالي يا ثابت شده با ارگانيسیم های بالقوه تولید کننده اسپور باشند از جمله در موارد طغیانهای کلستریدیوم دیفیسیل .

• بعد از استفاده از توالت .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط


در سایر موقعیتهای ارائه خدمات بالینی به شرح زیر که دستها بصورت آشکارا کثیف نمی باشد ترجیحاً با استفاده از محلولهای ضدغونی با بنیان الکلی و بکارگیری روش Hand rub رعایت بهداشت دستها را نمایید :

- قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با بیماران .
  - بعد از در آوردن دستکش استریل و یا غیر استریل از دست خود .
  - قبل از دست زدن به ، یا هرگونه جابجایی وسیله مورد استفاده در ارائه مداخلات درمانی تهاجمی برای بیمار . (صرفنظر از اینکه دستکش پوشیده اند یا خیر )
  - بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن ، غشاء مخاطی ، پوست آسیب دیده و یا پانسمان زخم در بیماران .
  - در صورتی که در حین مراقبت و یا انجام اقدامات درمانی ، دست شما بعد از تماس با ناحیه و یا موضع آلوده بدن بیمار با نواحی تمیز بدن او تماس خواهد یافت .
  - بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار ( مشتمل بر تجهیزات پزشکی )
- رعایت بهداشت دست قبل از آماده نمودن ، جابجایی و یا دادن غذا به بیماران و یا هرگونه جابجایی و یا آماده سازی داروهای بیماران بصورت اکید توصیه شده است .

### پنج موقعیت برای بهداشت دست

- قبل از تماس با بیمار (مانند دست دادن ، کمک به بیمار برای حرکت ، معاينه بالینی )
- قبل از اقدام به کار آسپتیک ( مانند پانسمان زخم ، آسپیراسیون ترشحات تنفسی ، گذاشتن کاتتر ، آماده کردن دارو ، مراقبت دهان و دندان )
- بعد از تماس با مایعات بدن بیمارو بلا فاصله بعد از درآوردن دستکش (مراقبت دهان و دندان ، آسپیراسیون ترشحات تنفسی ، خونگیری و کار با نمونه های خونی )
- بعد از تماس با بیمار ( پس از لمس بیمار یا محیط اطراف بیمار ، دست دادن ، کمک به بیمار برای حرکت ، معاينه بالینی )
- بعد از تماس با محیط اطراف بیمار ( حتی بدون تماس با خود بیمار مانند تعویض ملافه تخت ، تنظیم سرم وریدی )

### Your 5 moments for HAND HYGIENE



# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## پوشیدن دستکش

پوشیدن دستکش توسط کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در حین مراقبت از بیماران با توجه به دو هدف ذیل صورت می‌گیرد:

۱. پیشگیری از انتقال میکروارگانیسم‌ها از دست کارکنان به بیماران و یا از یک بیمار به بیمار دیگر در حین مراقبت و خدمت.
  ۲. پیشگیری از انتقال بیماری از بیماران به کارکنان.
- توجه به نکات ذیل ضروری است:
- استفاده از دستکش جانشین تمیز کردن دستها از طریق محلولهای حاوی الکل یا شستن دستها نمی‌باشد. بدون در نظر گرفتن پوشیدن دستکش یا تعویض آن دستها باید شسته شود.
  - در صورت تماس با خون یا سایر مواد بالقوه عفونی، مخاط و پوست آسیب دیده دستکش پوشیده شود. در صورتی که بریدگی یا زخمی در دستها وجود دارد، الزامی است از دستکش استفاده شود و موضع با پانسمان ضد آب پوشانده شود.
  - دستکش‌ها بعد از مراقبت از بیمار از دست خارج شوند.
  - از یک جفت دستکش برای مراقبت بیش از یک بیمار استفاده نگردد.
  - در طول مراقبت از بیمار اگر از ناحیه آلوده بدن بیمار به ناحیه تمیز بدن همان بیمار و یا محیط تمیز بخواهد دست بزنید دستکش‌ها را عوض کنید و یا آنها را در بیاورید.
  - از استفاده مجدد دستکش خودداری کنید.
  - ناخن‌های پرسنل کوتاه باشند.
  - استفاده از زیور آلات در محیط کار توصیه نمی‌شود.

## مراحل انجام پاکسازی، ضد عفونی و استریلیزاسیون

### ۱- نظافت یا پاکسازی Cleaning: نظافت یا پاکسازی:

نظافت یا پاکسازی به معنی حذف تمام آلودگی‌ها (مانند مواد آلی و معدنی) از اجسام و سطوح است. عمل پاکسازی به وسیله زدودن و یا استفاده از آب با ترکیبات آزمیمی یا دترجنت‌ها امکان پذیر است. پاکسازی قبل از روشهای ضد عفونی و استریلیزاسیون الزامی است. زیرا مواد آلی و معدنی که برروی وسائل باقی می‌مانند در کارآیی این روشهای تاثیر گذار است. این روش باعث حذف میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از اجسام و در نتیجه باعث ایمنی در کار می‌شود.

### ۲- ضد عفونی Disinfection :

طی این فرآیند تمامی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا به جز اسپور باکتریها بر روی اجسام بی جان از بین می‌رونند که معمولاً بوسیله مواد شیمیایی مرطوب انجام می‌گیرد.

ضد عفونی به علت نداشتن خاصیت اسپوریسیدال از استریلیزاسیون متمایز می‌شود. فقط تعداد کمی از مواد ضد عفونی کننده قادرند تا در مدت‌های تماس طولانی (۱۲ ساعت) اسپور باکتری‌ها را از بین برند که به آنها مواد استریل کننده شیمیایی گفته می‌شود.

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## ۳- استریلیزاسیون : Sterilization

استریلیزاسیون حذف کامل یا تخریب همه اشکال حیات میکروبی است که در مراکز درمانی هم به وسیله روش‌های فیزیکی و هم با روش‌های شیمیایی انجام می‌شود. عوامل اصلی استریل کننده شامل: بخار تحت فشار، حرارت خشک، گاز اتیلن اکساید، گاز پلاسمایا و مواد شیمیایی.

### اهمیت پاکسازی قبل از استریلیزاسیون :

- زدودن خون، بافت باقی مانده، چرک و نیز ذرات خارجی قابل روئیت: هنگامی که آلودگی‌های آلی مانند خون و بافت ها روی سطح وسیله رها شوند خشک شده و محکم به سطح وسیله خواهد چسبید و پس از گذشت زمان نیز زدودن آنها بسیار مشکل تر از قبل خواهد شد.
- کاهش بیو بوردن **Bioborden**: از طریق پاکسازی آن تعداد از جمعیت میکرووارگانیسم‌ها که روی وسایل قرار دارند قبل از مراحل ضدغ Fonی و استریلیزاسیون به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کنند بطوریکه این روش نسبت به زمانی که میکرووارگانیسم‌ها فقط کشته شوند(بوسیله اتوکلاؤکردن) مؤثرتر است.
- حفاظت از وسایل در برابر خوردگی: وسایل پزشکی نسبت به رسوب باقی مانده آلودگی‌ها حساس هستند این رسوبات در اثر رطوبت و درجه حرارت ناشی از فرایند استریلیزاسیون به ویژه هنگامی که از بخار برای این منظور استفاده می‌شود باعث زنگ زدگی شدید و خسارت جدی به وسایل می‌شود.
- حصول اطمینان از جابجایی ایمن تجهیزات و مواد: بعد از انجام پاکسازی، وسایل باید بخوبی کنترل شوند و سپس مجموعه‌های آنها جمع آوری و برای استریل سازی بسته بندی شوند پاکسازی و ضدغ Fonی پس از آن باعث می‌شود. این اقدامات در مورد وسایل و مواد به شکل ایمن و مطلوب انجام شود.

### تقسیم بندی وسایل پزشکی از CDC

این تقسیم بندی شامل سه دسته و بر اساس احتمال انتقال آلودگی از طریق وسایل می‌باشد و شامل سه دسته طبقه بندی بحرانی، نیمه بحرانی و غیر بحرانی است.

۱- ابزار و وسایل **Critical** یا بحرانی: وسیله‌ای که مستقیماً با جریان خون یا با قسمت‌هایی از بدن که بصورت نرمال استریل هستند در تماس قرار می‌گیرد در صورت آلودگی این وسایل با هر میکرووارگانیسمی از جمله اسپور باکتریها خطر بالای ایجاد عفونت وجود دارد نظیر انواع وسایل جراحی، کاتترهای قلبی، ایمپلنت‌ها و ... بیشتر وسایل این گروه باید به صورت استریل خردباری شوند و یا به وسیله روش استریلیزاسیون بخار استریل شوند.

۲- ابزار و وسایل نیمه بحرانی **Semi Critical**: وسایلی که در تماس با غشاء‌های مخاطی اند اما به سطوح بدن نفوذ نمی‌کنند وسایل درمانی تنفسی و بیهوشی، آندوسکوپ‌ها، تیغه‌های لارنگوسکوپ و سیستوسکوپ‌ها. اگر چه تعداد کمی اسپور باکتریها ممکن است بروی آنها وجود داشته باشد اما این وسایل پزشکی باید عاری از میکرووارگانیسم‌ها باشند. غشاء‌های ریه و دستگاه گوارش به طور معمول به عفونتها ای که به وسیله اسپور باکتریها ایجاد می‌شوند مقاوم هستند اما به دیگر ارگانیسم‌ها مانند بعضی از باکتریها، مایکو باکتریها و ویروس‌ها حساس هستند وسایل نیمه بحرانی حداقل به ضدغ Fonی سطح بالا نیازمند هستند گلوتارآلدید(سایدکس) پراکسیدهیدروژن پراستیک اسید از جمله این مواد ضدغ Fonی کننده می‌باشند.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

**۳- وسایل غیربحارانی No critical:** وسایل غیربحارانی آنهایی هستند که با بدن برخوردي ندارند و فقط با پوست سالم در تماس هستند پوست سالم به صورت سد مؤثری در برابر اغلب میکروارگانیسم ها عمل می کند مانند کاف فشار خون، نرده کنار تخت بیمار، ملحفه ها، وسائل بیمار و .... اغلب وسایل غیربحارانی می توانند تمیز شده و دوباره مورد استفاده قرار گیرند. در صورت عملکرد صحیح، ضدغونی و استریلیزاسیون می توان استفاده ایمن از وسایل پزشکی، تهاجمی و غیر تهاجمی را تضمین کرد.

رسیک انتقال عفونت	وسیله مورد استفاده	مثال	سطح ضدغونی مورد نیاز
بحارانی	هرگونه وسیله ای که داخل عروق یا بافتها استریل میشود	وسایل جراحی ، آرتروسکوپی و بیوپسی	استریلیزاسیون
نیمه بحارانی	وسایلی که در تماس با غشاء مخاطی و پوست سالم قرار می گیرند	وازنال اسپیکلوم ، آندوسکوپ و ابزار بیهوشی	ضد عفونی سطح بالا
غیر بحارانی	وسایلی که در تماس با پوست سالم هستند یا با بیمار تماس ندارند	تختخوابها ، دستگاه اندازه گیری فشار خون	ضد عفونی سطح متوسط یا پایین

### طبقه بندی کلی گندزداتها و مواد ضدغونی

#### - ضدغونی کننده های High level

برروی طیف وسیعی از ارگانیسم ها شامل باکتری ها ، قارچ ها ، مخمر ها ، ویروسها و اسپور ها موثر می باشد و در غلظت های مختلف گندزدا و استریل کننده می باشند این سطح از ضدغونی به عنوان استاندارد مناسب برای آماده سازی ابزارهای پزشکی نیمه بحارانی حساس به گرما کاربرد دارد ( آندوسکوپ ها ) مانند :

- پراکسید هیدروژن
- پراستیک اسید
- گلوتارآلدئید
- فرمالدئید

#### - ضدغونی کننده های Intermediate level

- تمام باکتریهای Vegetative از جمله باسیل توبرکولوز، تمام ویروس های لیپدی و برخی از ویروس های غیرلیپدی و برخی قارچ ها را از بین می برد. اما قادر به از بین بردن اسپور باکتری هانمی باشد.
- مانند کلر و ترکیبات آن
- ید و ترکیبات یده ( مانند بتادین )

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## • و الکل ها

- محلولهای ضد عفونی کننده level low

تمام باکتریهای Vegetative، قارچها، ویروسهای پوشش دار (ویروس نقص ایمنی و ویروس آنفلوانزا) و ویروسهای بدون پوشش (آدنوویروس) را از بین میبرد  
مانند فنل و ترکیبات فنلی

## تزریقات ایمن

### ۱. مقدمه:

با توجه به هدف غایی از ارائه خدمات درمانی که نجات جان و ارتقاء سطح سلامت بیماران می باشد، رسالت و مسئولیت کارکنان بهداشتی درمانی مبنی بر رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت و استانداردهای درمانی در راستای کاهش خطر انتقال عفونت های منتقله از خدمات سلامت فزونی می یابد که بخشی از آن با رعایت استانداردهای تزریق ایمن محقق می گردد.

### ۱-۱: تزریقات ایمن به معنای تزریقی است که :

۱- به دریافت کننده خدمت (بیمار) آسیب نزند.

۲- به ارائه کنندگان /کارکنان خدمات بهداشتی درمانی صدمه ای وارد نسازد .

۳- پسماندهای آن باعث آسیب و زیان در جامعه و محیط زیست نشود .

تزریقات یکی از روش های شایع در تجویز داروها و مشتقهای دارویی می باشد و بدیهی است در صورت عدم رعایت استانداردهای درمانی، خطرات بالقوه و بالفعلی را برآرائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمات بهداشتی درمانی و نیز جامعه تحمیل می نماید. تزریقات غیر ایمن می تواند سبب انتقال انواع پاتوژن ها از جمله ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و انگل ها شده و وقایع ناخواسته ای از جمله آبسه و یا واکنش های توکسیکی را در پی داشته باشد. استفاده مجدد از سرنگ و سر سوزن بیماران را در معرض عفونت مستقیم (از طریق وسایل آلوده) و یا غیر مستقیم (از طریق ویال دارویی آلوده) قرار می دهد. بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر سالیانه ۱۶۰۰۰ میلیون تزریق با هدف درمانی و یا بهداشتی تجویز می شود (به طور میانگین ۳/۴ تزریق به ازای هر فرد). ۵-۱۰ درصد تزریقات به منظور ارائه خدمات بهداشتی و ۹۰ درصد تزریقات به منظور ارائه خدمات درمانی تجویز می شوند و این درحالی است که اکثریت این تزریقات غیر ضروری می باشند. بر اساس مدل های ریاضی سازمان جهانی بهداشت که در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر در سال ۲۰۰۰ میلادی انجام شده است، ابتلاء ۲۱ میلیون مورد از موارد جدید مبتلایان به هپاتیت C (۴۰ درصد موارد جدید این بیماری کل) و ۲۶۰۰۰ مورد از موارد جدید مبتلایان به ایدز (۵ درصد جدید مبتلایان به هپاتیت B) ممکن است با آنودگی های نامحسوس نیز منتقل شوند. موارد جدید این بیماری را به تزریقات غیر ایمن ارتباط می دهند، ابتلاء به عفونت های منتقله از راه خون در میان کارکنان بهداشتی درمانی منجر به ۴/۴ درصد مورد HIV و ۳۹ درصد HBV و HCV شده است. بنابراین تکنیک ها و روش های استاندارد تزریقات، ایمنی کارکنان و بیماران را تضمین می نماید.

### ۱-۲: انتقال ویروس های منتقله از راه خون:

خطر انتقال عفونت های منتقله از راه خون بستگی به نوع عامل بیماری زا و حجم و نوع مواجهه دارد. پاتوژن هایی نظیر HBV و HBC ممکن است با آنودگی های نامحسوس نیز منتقل شوند.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

بیماری های قابل انتقال نظیر مalaria نیز از طریق خون منتقل می شوند اما برای انتقال نیازمند حجم زیادی از خون می باشند لذا از مخاطرات ضمن انتقال خون محسوب می شود.

### ۱. ویروس هپاتیت B :

HBV از طریق مواجهه بافت زیرپوستی و یا مخاطرات با خون آلوده و یا ترشحات بدن بیمار مبتلا ممکن است به افراد سالم منتقل شود. عفونت می تواند ناشی از مواجهه نامحسوس و از طریق خراشیدگی ها و یا زخم ها و یا سطوح مخاطی اتفاق افتد. آنتی ژن سطحی هپاتیت B که مؤید ابتلاء به هپاتیت B مزمن می باشد از سرم، بزاق و semen جدا شده و عفونت آن به اثبات رسیده است. HBV بیشترین غلظت را در سرم دارد و غلظت آن در بزاق و مایع سمن کمتر است. ویروس در محیط به طور نسبی پایدار می باشد و به مدت ۷ روز در دمای اتاق در روی سطوح در محیط زنده باقی می ماند. ابتلاء به عفونت هپاتیت B بعد از فرورفتن سرسوزن آلوده به خون یک منبع مثبت هپاتیت B ، در میان کارکنان خدمات بهداشتی درمانی ۶۲-۲۳ درصد است که البته مداخلات فوری و مناسب بر اساس موازین PEP<sup>۱</sup> خطر ابتلاء را کاهش می دهد، لذا واکسیناسیون تمامی کارکنان خدمات بهداشتی درمانی و منجمله کادر خدماتی بر علیه هپاتیت B الزامی بوده قبل از اشتغال آنان در واحدها و بخش های بالینی توصیه می شود.

### ۲. ویروس هپاتیت C :

به طور اولیه HCV از طریق مواجهه بافت زیر جلدی با خون آلوده منتقل می شود. انتقال آن به نسبت HBV کمتر است. در محیط به مدت حداقل ۱۶-۲۳ ساعت زنده باقی می ماند. انتقال بیماری از طریق خون آلوده به اثبات رسیده است و از طریق مواجهه پوست ناسالم و یا مخاطرات با خون آلوده به ندرت وجود دارد.

### ۳. HIV

انتقال HIV از طریق تماس جنسی، انتقال عمودی و یا مواجهه با خون آلوده (انتقال خون و یا تزریقات غیر ایمن) و سر سوزن و سرنگ مشترک بین معتمدان اتفاق می افتد. ماندگاری HIV در محیط و قابلیت انتقال آن به نسبت HCV یا HBV کمتر است. ترشحات و مواد ترشحی بدن بیماران مشتمل بر خون، سایر ترشحات بدن، مایع سمن و ترشحات واژینال که به طور مشهود خون آلود می باشند در صورت تماس با جراحات بافت زیر جلدی ، غشاء مخاطی و پوست ناسالم برای کارکنان مخاطره آمیز محسوب می شوند. میانگین خطر انتقال بعد از مواجهه زیر جلدی با خون آلوده ۳/۰ درصد و برای تماس غشاء مخاطی ۰/۹ درصد تخمین زده می شود.

### ۴-۱: خط مشی های پیشگیرانه:

حذف تزریقات غیر ضروری بهترین روش پیشگیری از عفونت های ناشی از تزریقات غیر ایمن است. در برخی از کشور ها ۷۰ درصد تزریقات غیرضروری محسوب می شوند. در صورتی که درمان مؤثر از سایر طرق ممکن باشد به منظور کاهش امکان مواجهه با خون و مواد عفونی و خطر انتقال، به عنوان روش ارجح و مورد توصیه است.

واکسیناسیون کارکنان خدمات بهداشتی درمانی علیه هپاتیت B جهت حفاظت کارکنان و بیماران بسیار حائز اهمیت است. سایر روش های مؤثر در کاهش خطر انتقال عبارت است از رعایت بهداشت دست، پوشیدن دستکش، به حداقل رسانیدن دست کاری وسایل تیز و برنده منجمله وسایل تزریق ، تفکیک مطلوب و دفع بهداشتی وسایل تیز و برنده از مبدأ.

<sup>۱</sup>Post Exposure Prophylaxis

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

### **۲: بهترین روش ها در انجام تزریقات:**

#### **۱-۲: اصول ایمنی کلی در انجام تزریقات:**

- رعایت بهداشت دست،
- پوشیدن دستکش در موضع ضروری،
- استفاده از سایر وسایل حفاظت فردی یک بار مصرف،
- آماده سازی و ضدغونی پوست.

#### **۱-۱: رعایت بهداشت دست:**

بهداشت دست واژه ای کلی است که به شستشوی دست ها با آب و صابون و یا با استفاده از ماده ضدغونی ، محلول های ضدغونی و یا ضدغونی قبل از جراحی اطلاق می شود.

#### **راهنمای عملی برای رعایت بهداشت دست:**

- قبل از آماده نمودن داروهای تزریقی و بعد از اتمام تزریق، قبل و بعد از هر گونه تماس مستقیم با بیماران برای انجام اقدامات درمانی، قبل و بعد از پوشیدن و در آوردن دستکش بهداشت دست ها را رعایت فرمایید.
- در صورت کثیفی و یا آلودگی دست ها با مایعات بدن و خون ممکن است مابین تزریقات نیز نیازمند رعایت بهداشت دست با آب و صابون می باشد.
- توجه نمایید در صورتی که پوست دست ارائه کننده خدمت ، برباد و یا مبتلا به درماتیت باشد، از انجام تزریق برای بیمار اجتناب شود و توصیه می شود که زخم های کوچک پانسمان گرددند.

#### **۱-۲: دستکش :**

در ضمن ارائه اقدامات مراقبتی، تشخیصی و درمانی، در صورتی که احتمال مواجهه با خون و یا فرآورده های خونی می باشد الزامی است کارکنان از دستکش لاتکس، بدون لاتکس و یا تمیز کاملاً اندازه دست خود استفاده نمایند.

#### **راهنمای عملی استفاده از دستکش:**

- در زمانی که احتمال تماس مستقیم با خون و یا سایر مایعات و ترشحات بدن و بزاق (بالقوه عفونی بیماران)، وجود دارد از دستکش یک بار مصرف غیر استریل که کاملاً اندازه دستان می باشد ، استفاده نمایید.
- در زمان انجام تزریق وریدی و یا خون گیری
- در صورتی که پوست دست فرد ارائه دهنده خدمت به دلیل ابتلاء به اگزما و یا خشکی و ترک خوردگی سالم نیست.
- در صورتی که پوست بیمار به دلیل ابتلاء به اگزما و یا سوختگی و یا عفونت سالم نیست.
- لیکن از آن جا که پوشیدن دستکش هیچ گونه حفاظتی در قبال needle-stick و یا سایر زخم های سوراخ کننده<sup>۱</sup> که به دلیل فرو رفتن اشیاء نوک تیز و برنده رخ می دهند، ایجاد نمی نماید، در صورت سلامت کامل پوست دست فرد ارائه کننده

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

خدمت در زمان انجام تزریقات معمول داخل پوستی و زیر جلدی و عضلانی ، و بیمارپوشیدن دستکش توصیه نمی شود.

(نهایت احتیاط در جابجایی و کار با اشیاء نوک تیز و برندۀ نظیر سرسوزن ها و اسکالپل توصیه می شود.)

### ۳-۱-۲: سایر وسائل حفاظت فردی یک بار مصرف:

برای انجام تزریقات استفاده از ماسک، حفاظ چشمی و یا سایر موارد حفاظتی توصیه نمی شود، مگر در موقعی که احتمال آلودگی با خون و یا پاشیده شده خون و ترشحات بیمار به فرد ارائه کننده خدمت پیش بینی می شود.

### راهنمای عملی در ضمانت از وسائل حفاظت فردی :

در صورت استفاده از وسائل حفاظت فردی، بلافصله بعد از استفاده آن ها را به روش مطمئن دفع نمایید.

### ۴-۱-۲: آماده سازی و ضدغونی پوست در انواع مختلف تزریقات

ضدغونی و آمادگی پوست		نوع تزریق	
محلول های با پایه الکلی ۷۰-	آب و صابون		
۶۰ درصد (ایزوپروپیل و یا اتانول)			
خیر	بله	داخل جلدی	
خیر	بله	زیر جلدی	
خیر	بله	واکسیناسیون	عضلانی
بله	بله	درمانی	
بله	خیر		وریدی

### راهنمای عملی برای ضدغونی و آماده سازی پوست:

#### برای ضدغونی پوست گام های ذیل را بردارید:

- از سوآب پنبه یک بار مصرف آغشته به محلول های با پایه الکلی ۶۰-۷۰ درصد (ایزوپروپیل و یا اتانول) برای ضدغونی موضع تزریق استفاده نمایید. از متیل الکل و یا مтанول جهت تزریق استفاده ننمایید.

باید ها	باید ها
رعایت بهداشت دست را فراموش نکنید	بهداشت دست ها را با استفاده از آب و صابون و یا محلول های Hand Rub رعایت نمایید. این عمل را به دقت و بر اساس روش شستشوی توصیه شده در راهنمای رعایت بهداشت دست ابلاغی از وزارت بهداشت، انجام دهید.
از یک جفت دستکش برای بیش از یک تزریق استفاده نکنید برای استفاده مجدد از دستکش مصرف شده، آن را نشویید.	در صورت لزوم، از یک جفت دستکش یک بار مصرف غیر استریل استفاده نمایید و دستکش را ما بین بیماران و یا به ازای انجام هر اقدام درمانی تعویض نمایید.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

<p>سرنگ، سرسوزن و لانست را فقط یک بار مصرف کنید.</p>	<p>برای اخذ نمونه خون و کشیدن خون فقط برای یک بار از وسیله تزریقات یک بار مصرف استفاده کنید.</p>
<p>بعد از ضد عفونی، موضع تزریق را <u>لمس ننمایید</u>.</p>	<p>در صورت نیاز به دسترسی وریدی، موضع تزریق را ضد عفونی <u>نمایید</u>.</p>
<p>سرسوزن را در خارج از ظروف ایمن <u>نیندازید</u>.</p>	<p>فورا پس از مصرف ، وسائل تزریق مصرف شده را در ظروف ایمن <u>دفع ننمایید</u>.</p>
<p>برای گذاردن درپوش سر سوزن از دو دست استفاده نکنید.</p>	<p>در صورتی که گذاردن درپوش سرسوزن مورد استفاده ضروری است برای گذاردن درپوش به روش یک دستی اقدام <u>نمایید</u>.</p>
<p>بیش از <math>\frac{3}{4}</math> ظروف ایمن را <u>پرنکنید</u> و یا درب آن را جدا <u>نمایید</u>.</p>	<p>ظروف ایمن را با درپوش محافظه مهر و موم <u>نمایید</u>.</p>
<p>از تزریق خون به داخل لوله آزمایش زمانی که آن را با دست دیگر نگه داشته اید، <u>اجتناب ننمایید</u>.</p>	<p>لوله نمونه خون را قبل از ورود سر سوزن به داخل آن ، در <u>rack قرار دهید</u>.</p>
<p>پروفیلاکسی بعد از مواجهه با اجسام بالقوه آلوده را در ظرف ۷۲ ساعت انجام داده ، چرا که بعد از ۷۲ ساعت بی اثر می باشد.</p>	<p>در صورت وقوع <u>needle stick</u>، آن را گزارش نمایید و پرو تکل بیمارستان را در ارتباط با پروفیلاکسی بعد از مواجهه <u>دبیال ننمایید</u>.</p>

۲. موضع تزریق را از مرکز به خارج با پنبه الکل ضد عفونی نمایید.
۳. پنبه الکل را به مدت ۳۰ ثانیه در موضع تزریق به روش فوق الذکر بمالید.

توجه :
<p>✓ استفاده از آب و صابون جهت آماده سازی پوست موضع تزریق قبل از تزریقات داخل جلدی، زیر جلدی و عضلانی <u>توصیه می شود</u>. که در صورت مهیا بودن در بیمارستان و آمادگی بیمار و ارائه دهنده خدمت قابل استفاده است و در غیر این صورت استفاده از الکل <u>بلامانع است</u>.</p> <p>✓ هرگز از سوآب پنبه آماده موجود در ظروف پنبه الکل که در الکل خیس خورده اند به دلیل آلودگی به وسیله باکتری های دست و محیط جهت تزریق استفاده <u>ننمایید</u>.</p> <p>✓ از الکل برای ضد عفونی موضع در تلقیح واکسن ها استفاده <u>ننمایید</u>.</p>

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

### ۱-۵: خلاصه گام های ضروری در تزریقات:

- اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت

### ۲-۱: داروها و وسایل تزریق

### ۲-۲: وسایل تزریق

مراکز بهداشتی درمانی جهت ارائه تزریقات ایمن باستی کفايت وجود وسایل تزریق یک بار مصرف را تضمین نمایند.

#### راهنمای عملی برای استفاده از وسایل تزریق:

- برای هر تزریق منجمله؛ آماده نمودن یک واحد تزریق دارو و یا واکسن از سرنگ و سرسوزن استریل جدید استفاده نمایید.
- قبل از استفاده از سرنگ، بسته بندی سرنگ و سرسوزن را بررسی کرده تا از سلامت آن مطمئن شوید.
- در صورتی که ناریخ انقضای سرنگ و سرسوزن سرآمده و یا بسته بندی آن پاره و صدمه دیده است، آن را دور بیندازید.

### ۲-۳: داروهای:

#### انواع ظروف دارویی و توصیه نحوه استفاده از آن ها:

دلالی	توصیه ها	ظرف دارویی
ضعیف بودن احتمال آلودگی	نوع ارجح	ویال های تک دوز
بالا بودن احتمال آلودگی در صورتی که از تکنیک آسپتیک استفاده نشود.	فقط در موارد ضروری	ویال های چند دوز
	شکستن آمپول ممکن است به هدر رفتن محتويات آمپول و صدمه دست ارائه خدمت، منجر شود.	آمپول ها
بالا بودن احتمال آلودگی	برای تزریقات معمول توصیه نمی شود.	کیسه های مایع و محلول های (۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتری)

#### راهنمای عملیاتی در دادن دارو<sup>۳</sup> به بیمار:

- هرگز از داروی کشیده شده در یک سرنگ برای تزریق به چند بیمار استفاده نکنید(برای هر بار تزریق یک سرنگ و سرسوزن مصرف کنید).
- از تعویض صرفاً سرسوزن و استفاده مجدد از یک سرنگ برای چند بیمار اجتناب ورزید.
- از یک سرنگ و سرسوزن برای حل چند ویال دارویی استفاده ننمایید.
- از مخلوط نمودن باقیمانده داروهای حل شده برای مصرف بعدی اجتناب ورزید.
- به منظور کاهش احتمال آلودگی متقطع بین بیماران، حتی المقدور از ویال های تک دوزی برای هر بیمار استفاده نمایید.
- استفاده از ویال های چند دوزی تنها در زمانی توصیه می شود که راه حل منحصر به فرد باشد.

<sup>۳</sup> giving medications

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

- به صورت هم زمان دو یا چند ویال دارویی را در بالین بیماران باز نکنید.
- در صورت امکان یک ویال چند دوزی را به هر بیمار اختصاص داده و بعد از چسبانیدن برچسب نام بیمار و تاریخ باز نمودن ویال بر روی آن مطابق با توصیه کارخانه سازنده آن را در شرایط و محل توصیه شده نگاهداری نمایید.
- ویال های چند دوزی را در فضای باز بخش به دلیل احتمال آلودگی با اسپری ها و ترشحات محیطی قرار ندهید.
- ویال های چند دوزی را در موارد ذیل مطابق با دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی دفع نمایید:
  - a. در صورتی که استریلیتی و یا محتوی ویال خراب شده است.
  - b. در صورتی که تاریخ انقضاء دارو گذشته است(حتی در صورتی که دارو دارای مواد محافظ آنتی میکروبیال باشد).
  - c. در صورتی که دارو بعد از باز شدن به طرز مناسبی نگاهداری و انبارنشده باشد.
  - d. در صورتی که دارو دارای مواد محافظ آنتی میکروبیال نباشد، ۲۴ ساعت بعد از باز کردن ویال دارویی و یا پس از انقضاء زمان توصیه شده توسط کارخانه سازنده.
  - e. صرف نظر از تاریخ انقضاء دارو، در صورتی که دارو به طرز مناسبی انبار نشده، سهواً آلوده شده و یا بر روی آن تاریخ تولید درج نشده باشد.
  - f. تا حد امکان از ویال های snap<sup>3</sup> که برای شکستن سر آن ها نیاز به اره نمی باشد استفاده نمایید . در صورتی که برای باز نمودن یک آمپول نیاز به اره فلزی می باشد برای حفاظت انگشتان خود از یک پد کوچک استفاده نمایید.

### **۳-۲-۲: آماده نمودن تزریقات:**

تزریقات را بایستی در یک فضای معین که احتمال آلودگی با خون و ترشحات بدن وجود نداشته باشد، آماده نمود.

#### **راهنمای عملیاتی برای آماده نمودن تزریقات:**

سه گام اساسی ذیل برای آماده نمودن تزریقات بردارید.

۱. فضایی که جهت آماده نمودن تزریقات مورد استفاده قرار می دهید را منظم نگاهدارید تا تمیزی آن به سهولت ممکن باشد.
۲. قبل از اقدام برای آماده سازی داروها و یا در زمانی که این فضا آلوده به خون و یا ترشحات بدن شده باشد ، آن را بالکل ۷۰ درصد (ایزوپرپیل الکل و یا اتانول) تمیز نموده و اجازه دهید تا کاملا خشک شود.
۳. کلیه وسایل مورد نیاز برای تزریقات را بچنید:
  - ✓ سرنگ و سر سوزن استریل یک بار مصرف
  - ✓ حلال نظیرآب مقطر و یا حلال های خاص
  - ✓ سواب پنبه الکل
  - ✓ ظروف ایمن برای دفع ایمن پسماندهای نوک تیز و برنده

<sup>3</sup> Pop-open ampoules

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## ویال های دارویی سپتوم دار

۱. سر ویال دارویی را با پنبه آغشته به الکل ۷۰ درصد (ایزوپروپیل و یا اتانول) پاک نمایید و قبل از ورود سر سوزن به داخل آن اجازه دهید در معرض هوا خشک شود.
۲. در صورتی که ویال های مولتی دوز در اختیار دارید، برای کشیدن هر بار دارو، از سر سوزن و سرنگ استریل استفاده نمایید.
۳. هیچ گاه بعد از کشیدن دارو از ویال مولتی دوز، سر سوزن را پس از جدا نمودن سرنگ در داخل آن رها ننمایید.
۴. در اسرع وقت پس از کشیدن دارو از ویال مولتی دوز اقدام به تزریق نمایید.

### • برچسب زدن ویال های دارویی آماده شده:

پس از آماده نمودن ویال های مولتی دوز بر روی ویال داروی موارد ذیل را با برچسب بزنید:

۱. تاریخ و زمان آماده نمودن دارو
۲. نوع و حجم حلال
۳. غلطنت نهایی
۴. تاریخ و زمان انقضاء پس از حل نمودن دارو
۵. نام فرد مسئول

### • برای ویال های دارویی مولتی دوزی که نیاز به آماده سازی ندارند مشخصات ذیل را درج نمایید:

۱. تاریخ و زمان اولیه ای که از ویال استفاده نموده اید.
۲. نام فرد مسئول

## ۴-۲-۲: تجویز دارو به بیمار:

برای تجویز کلیه تزریقات بایستی از تکنیک آسپتیک استفاده نمایید:

### راهنمای عملیاتی برای تجویز تزریقات:

#### احتیاطات عمومی:

۱. نام و دوز دارو را قبل از تجویز کنترل نمایید.
۲. بهداشت دست را رعایت نمایید.
۳. سر ویال را با پنبه آغشته به الکل ۷۰ درصد (ایزوپروپیل و یا اتانول) پاک نمایید.
۴. از سر سوزن و سرنگ استریل (یک بار مصرف) برای کشیدن دارو استفاده نمایید.

### روش آماده سازی:

۱. برای آماده سازی ویال از سرنگ استریل استفاده نمایید.
۲. پس از تزریق میزان کافی از مایع حلال به داخل آمپول و یا ویال، تا از بین رفتن ذرات جامد قابل مشاهده در ویال کاملاً آن را تکان دهید.
۳. بعد از آماده نمودن سر سوزن و سرنگ را از داخل ویال در آورده و بدون جدا نمودن آن ها از یکدیگر، آن را در ظروف ایمن دفع نمایید.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

۴. در صورتی که فوراً دارو تزریق نمی شود ، به روش یک دستی <sup>۵</sup> درپوش آن را بگذارید و آن را در جای مطمئنی قرار دهید.

### نکات مهم:

- از تماس سرسوزن با سطوح آلوده ممانعت نمایید.
- از استفاده مجدد سرنگ حتی اگر سر سورن هم تعویض شده باشد، اجتناب نمایید.
- از لمس دیافراگم پلاستیکی سر ویال دارویی پس از ضد عفونی با الکل ۷۰ درصد اجتناب نمایید.
- از داخل نمودن یک سرسوزن و سرنگ به داخل چندین ویال مولتی دوز خودداری نمایید.
- برای یک بیمار و یا چندین بیمار مختلف از سرسوزن و سرنگی که یک بار جهت تزریق دارو از آن استفاده شده است ، استفاده ننمایید.
- از یک کیسه و یا شیشه مایعات وریدی برای تزریق به بیماران متعدد استفاده ننمایید.

### ۳-۲: پیش گیری از ایجاد جراحت کارکنان بهداشتی درمانی با وسائل نوک تیز و برنده

۱. جهت رعایت اصول ایمنی برای شکستن ویال های دارویی با استفاده از یک محافظ مثل پد از تیغ اره استفاده شود
۲. پس از تزریق از گذراندن درپوش سرسوزن اکیداً خودداری نمایید مگر در شرایط خاص که گذاردن درپوش به روش یک دستی بایستی انجام شود .
۳. از شکستن و یا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداری نمایید.
۴. الزامی است سر سوزن و سایر اشیاء تیز و برنده مصرفی ( آنزیو کت ، بیستوری ، لانست ، اسکالپ وین ، ویال های شکسته و ...) بالفاصله پس از مصرف در ظروف ایمن جمع آوری وسپس به یکی از صور استاندارد امحاء و بی خطرسازی پسماند های خطروناک بهداشتی درمانی تبدیل به پسماند شبه خانگی شده و همراه با سایر پسماندهای بیمارستانی به نحو مطلوب دفع گردند .
۵. به منظور پیش گیری از جراحات ناشی از وسائل تیز و برنده دفع سرسوزن و سرنگ ( با هم ) و در صورت محدودیت منابع در تامین ظروف ایمن در بیمارستان، دفع سر سوزن ( به تنهایی ) بلامانع می باشد.
۶. به منظور پیش گیری از جراحات ناشی از وسائل تیز و برنده الزامی است این وسائل سریعاً پس از مصرف در ظروف ایمن دفع گردند ، لذا بایستی ظروف ایمن به تعداد کافی و با ابعاد گوناگون در دسترس ارائه دهندها خدمات در کلیه واحد های ذی ربط قرار داشته باشند . توجه نمایید از باقی ماندن ظروف ایمن در بیش از ۵ روز در محیط درمانی اجتناب شود، بدیهی است این مدت در دمای بالاتر کاهش می یابد.
۷. به منظور پیش گیری از سرریز شدن وسائل دفعی ، در صورتی که حداکثر  $\frac{3}{4}$  حجم ظروف مزبور پر شده باشد ، ضروری است درب ظروف به نحو مناسب بسته و دفع شوند .
۸. جهت حمل وسائل تیز و برنده از رسیپیور استفاده نمایید و از حمل وسائل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری نمایید.

<sup>۵</sup> one-hand scoop

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

۹. ضروری است ظروف جمع آوری پسماند های نوک تیز و برنده مستحکم ، غیر قابل نفوذ ، دهانه گشاد ، دارای قفل و ضامن <sup>۶</sup> مقاوم به پارگی و از حجم کافی و بعد مناسب برخوردار باشند.
۱۰. استفاده از برچسب هشداردهنده بر روی ظروف جمع آوری با مضمون "احتمال آلودگی با اشیاء تیز و برنده عفونی " به منظور جلب توجه کارکنان بهداشتی درمانی و پیش گیری از آلودگی آنان الزامی است .
۱۱. ظروف ایمن حاوی پسماندهای نوک تیز و برنده و پسماندهای عفونی را جهت انتقال به اتاقک موقت نگه داشت پسماندها مهر و موم نمائید . بعد از مهر و موم ظروف ایمن محتوى پسماند های نوک تیز و برنده از باز کردن ، تخلیه ظروف و استفاده مجدد و فروش سر سوزن و سرنگ داخل آن اجتناب نمائید .
۱۲. وجود این ظروف در کلیه واحد های بهداشتی درمانی اعم از خصوصی و دولتی در محل ارائه خدمت <sup>۷</sup> الزامی است

### **منابع :**

- ۱- راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی - دکتر حسین معصومی اصل و ...
- ۲- راهنمای کنترل عفونت در بیماریهای تنفسی حاد و اگیر - دفتر امور پرستاری معاونت سلامت
- ۳- مدیریت مواجهه شغلی با HCV / HBV / HIV توصیه هایی برای پروفیلاکسی پس از تماس - معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- ۴- دستورالعمل تزریقات ایمن - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت سلامت - مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان - واحد ایمنی بیمار
- ۵- اصول پاکسازی ، ضد عفونی و استریلیزاسیون در مراکز درمانی - سینا مباشری زاده و ...
- ۶- پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی - دکتر حسین معصومی اصل و دکتر شیرین افهمی
- ۷- دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت سلامت - مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان - واحد ایمنی بیمار

<sup>۶</sup> Double lock

<sup>۷</sup> Point of care

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط



### بهداشت محیط: Environmental Health

عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی بر رفاه و سلامت جسمی - روانی - اجتماعی افراد تاثیر دارد یا خواهد داشت.

### بهداشت محیط بیمارستان: Environmental Health Hospital

کلیه اقداماتی که به منظور سالم سازی محیط بیمارستانها انجام می شود تا عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کنند. لذا عواملی محیطی مانند آب، فاضلاب، زباله، نور- تهويه- مواد غذایی و وسائل مورد استفاده در بیمارستانها بایستی به دقت کنترل شوند تا ضمن فراهم آوردن محیط سالم و بهداشتی به بهبود و درمان بیماران کمک نموده و از اشاعه بیماریها به خارج و یا داخل بیمارستان جلوگیری به عمل آورد.

ضدغونی کننده ها:

تعاریف و اصطلاحات

(Detergent) دترجننت:

ماده ای است که با استفاده از کاهش کشش سطحی آلودگی را می برد و اجازه می دهد تا ضدعفونی کننده ها به میکروارگانیسم ها که در زیر یا پایین آن ها قرار دارند دستریسی پیدا کنند.

: (Cleaning) شستشو یا نظافت

برطرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گرد و غبار، خون ، مخاط و ....از روی وسایل که اغلب با استفاده از آب و یک نوع ماده صابونی انجام می گیرد . این مرحله بایستی برای کلیه وسایل پزشکی که نیاز به گندزدایی و یاسترون سازی دارند نیز حتما انجام شود زیرا می تواند به طور موثری باعث کاهش مقدار میکرو ارگانیسم های موجود روی وسایل آلوده شود و در نتیجه مراحل بعدی ( گندزدایی یا سترون سازی ) اسریع تر و موثرتر انجام شود.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

### گندزدایی یا ضد عفونی (Disinfection) :

برطرف کردن بسیاری یا همه میکرو ارگانیسم های پاتوژن نظیر باکتری های زایا، قارچ ها، انگل ها و ویروسها به جز اندوسپور باکتری ها از روی وسائل می باشد.

### سترون سازی یا استریلیزاسیون (Sterilization) :

برطرف کردن و نابود کردن همه اشکال حیاتی میکروارگانیسم ها نظیر باکتری ها، اسپور باکتری ها، مایکوباکتریوم و بروس ها، قارچ ها و انگل ها

### مراحل مبارزه با میکروبها در بیمارستان

نظافت، ضد عفونی ، استریلیزاسیون به عنوان ۳ مرحله مبارزه با میکروبها و آلودگی ها می باشد.

همیشه باید این سه مرحله به ترتیب و پشت سرهم انجام شود. یعنی اگر نظافت خوبی نداشته باشیم ضد عفونی کردن فایده ای ندارد و استریلیزاسیون نیز بدون نظافت و ضد عفونی نتیجه مطلوبی نخواهد

تقسیم بندی وسائل پزشکی از سوی مرکز پیش گیری و کنترل بیماری های آمریکا ( تقسیم بندی اسپالدینگ )

#### ۱. وسائل حیاتی: ( Critical )

وسائلی هستند که هنگام کاربرد آن ها در تماس مستقیم با جریان خون یا نواحی استریل بدن می باشند مثل چاقوهای جراحی، سوزن های تزریق و بخیه، کاتترهای عروقی و... این وسائل بایستی سترون سازی شوند.

#### ۲. وسائل نیمه حیاتی: ( Semi-critical )

وسائلی هستند که در تماس با سطوح مخاطی بدن ( مخاط تنفسی فوقانی، تناسلی ادراری و... ) یا پوست آسیب دیده ( سوختگی و بریدگی ) می باشند. مانند کاتترهای ادراری، استکولوم های معاینه زنان یا بینی باندراها و... این وسائل بایستی ترجیحا سترون سازی شوند اما گندزدایی سطح بالا نیز برای آن ها قابل قبول است.

#### ۳. وسائل غیر حیاتی: ( Noncritical )

وسائلی هستند که در تماس با پوست سالم هستند مانند گوشی پزشکی، الکترودهای قلبی، کاف فشار خون و... سطوح و محیط بیمارستانی نظیر کف زمین و دیوارها نیز در این گروه قرار می گیرند. این وسائل بایستی شستشو یا گندزدایی سطح پایین شوند.

طبقه بندی گندزداها و ضد عفونی کننده ها:

- ضد عفونی کننده های High Level یا سطح بالا : مانند پراکسیدهیدروژن ، پراکستیک اسید ، گلوتار آلدھید ، نرمالوبند
- ضد عفونی کننده های سطح متوسط Intermediate Level یا : شامل کلروترکیبات آن ، ید ، الکل ها

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

۳- ضد عفونی کننده های سطح پائین یا Level Low : شامل فنول و ترکیبات آن و ترکیبات آمونیوم کواترنا

### "سطح خدماتی به دو دسته تقسیم می شوند"

۱. سطوحی که کمترین تماس دست با آن ها وجود دارد(مثل کف و سقف) هنگام وجود آلودگی یا لکه ترشحات و نیز هنگامی که بیمار از مرکز مخصوص می شود، به انجام نظافت به طور منظم نیاز دارد(کف حداقل در هر شیفت کاری یک بار نظافت شود)
۲. سطوحی که دست به طور مکرر با آن ها در تماس است (مانند دستگیره درب ها، نرده های تخت ها، کلیدهای برق، دیوارهای اطراف دستشویی در اتاق بیمار و حاشیه پاراوان ها) که در نظافت آن ها دقیق بیشتری شود.

طریقه مصرف ضد عفونی کننده ها:

#### ۱- محلول های کنسانتره:

ابتدا بایستی نسبت به رقیق سازی محلول کنسانتره اقدام شده و پس از تهیه محلول رقیق شده با غلظت مورد نظر نسبت به غوطه ورسازی وسایل پزشکی حساس به گرمای زمان توصیه شده اقدام گردد.

#### ۲- محلول های آماده مصرف:

مواد آماده مصرف نیازی به رقیق سازی نداشته و فقط زمان ماند توصیه شده بایستی رعایت گردد.

#### دستورالعمل کلی در مورد کاربرد ضد عفونی کننده ها و گندزداها:

برای رقیق سازی در مصرف گروه ها مختلف مواد شیمیایی نکات مهمی وجود دارد که رعایت آنها به منظور کنترل موثر میکروارگانیسم ها الزامی است . برخی از این نکات بر روی برچسب آنها قید شده و بعضی نیز جنبه عمومی دارند که در اینجا نکات کلی و مفید درباره این ترکیبات ذکر می گردد.

- ماده مصرفی باید به دقیق پیمانه شود.
- برای ساختن محلول بایستی از ظروف خشک استفاده شود.
- برای ساختن محلول بایستی مقدار مناسبی از آب به ماده گندزدا افزوده گردد.
- پیش از کاربرد ماده گندزدا در صورت امکان لکه ها و کثافات پاک شوند .
- مازاد ماده گندزدا در پایان کار روزانه دور ریخته شود.
- توجه شود که کاربرد محلولهای ضد عفونی کننده گندزدا ، بدون دقیق و مهارت سبب افزایش رشد میکروبها و گسترش عفونتها می گردد.
- هرگز از ضد عفونی کننده ها و ماده گندزدا برای استریل کردن استفاده نشود.
- ابزار و وسایل تمیز بایستی درون محلولهای میکروب کش نگهداری شوند.
- ظروف حاوی مواد گندزدا نبایستی دوباره پر شوند بلکه باید محلول داخل آنها عوض شود .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- از به کار گیری محلولهای گندزدا که همراه فرد به بیمارستان آورده شده بایستی پرهیز شده و از آنچه که بیمارستان در اختیار قرار میدهد استفاده گردد.
- از به کار گیری محلولهای ساخته شده در روزهای قلی بایستی پرهیز شده و هر روز محلول تازه ای ساخته شود.
- هرگز دو محلول ضد میکروبی را با هم نبایستی به کار برد، مگر آنکه یکی از آنها الكل باشد.
- از ترکیب و اختلاط پاک کننده ها با مواد گندزدا باید پرهیز گردد زیرا ممکن است اثر هر دو خنثی گردد.
- فقط در صورتی که کاربرد روشهای حرارتی ممکن نباشد از محلولهای میکروب کش انتخابی استفاده گردد.
- از اختلاط گندزداهابا دترجنت (پاک کننده) ها بپرهیزید زیرا ممکن است سبب بی اثر شدن هم شوند.

### پاشیده شدن خون و مواد آلوده بدن در محیط (لکه زدایی سریع)

به دنبال ریخته شدن موادی مانند ادرار یا غذا، پاک کردن محل با آب و یک ماده دترجنت معمولاً کافی است ولی اگر ترشحات، حاوی ارگانیسم های بالقوه خطرناک باشند باید از یک ماده گندزدا استفاده کرد.

برای پاک کردن ترشحاتی که از آلودگی آنها مطمئن هستیم باید همیشه دستکش یک بار مصرف پوشید و اگر خطر آلودگی لباس نیز وجود دارد بایستی از آپرون پلاستیکی (یک بار مصرف) استفاده گردد.

۱) در صورت پاشیده شدن خون و مایعات آلوده به خون در محیط (به دلیل احتمال آلودگی با عوامل بیماری زا منتقله از راه خون مانند HIV،... )جهت رفع الودگی توسط پرسنل خدماتی بخش باید، دستکش و در صورت لزوم سایر محافظه ها پوشیده شود (رعایت احتیاطات استاندارد).

۲) خون و مواد آلوده با دستمال یک بار مصرف جمع آوری و پاک شود. (دستمال یک بار مصرف به دستمال کاغذی و یا ساخته شده از الیاف پنبه گفته می شود) کاغذی و پاک شود. (دستمال یک بار مصرف به دستمال کاغذی و از بین می رود).

۳) محل مورد نظر با آب و دترجنت (صابون یا پودر شستشو) شسته شود.

۴) با محلول هیپوکلریت سدیم (آب ژاول خانگی، وایتكس) گندزداشی شود. اگر سطح آلوده شده صاف باشد، از رقت ۱ درصد و در صورت داشتن خلل و فرج از رقت ۱۰ درصد ماده گندزدا استفاده می شود. مایع ضد عفونی کننده بایستی به طور صحیح و دقیق رقیق شده و برای هر بار استفاده به طور تازه تهیه گردد

نکته: در صورتیکه مقدار زیادی خون یا مایعات بدن آلوده به خون در محیط ریخته شود یا اگر خون و سایر مایعات حاوی شیشه شکسته یا اشیای نوک تیز باشد باید حوله یکبار مصرف روی آن پهنه کرده و روی آن مواد گندزدا (وایتكس ۱/۱۰ یا ۱۰٪) ریخته شود و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کرده سپس با حوله یکبار مصرف آن را جمع کرده و آن قسمت را با آب و دترجنت پاک و تمیز کرده و در انتهای محل را با ماده گندزدا ضد عفونی گردد.

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

گندزدایی سطوح ، تجهیزات و ابزار پزشکی



کف زمین:

- پاک کردن زمین از آلودگی + آغشته نمودن تی نخی تمیز و خشک با واپتکس تی کشی زمین بصورت زیگزاگ از ابتدای سطح به انتهای + شستن و آغشته کردن تی با واپتکس قبل از تی کشی اتاق بعدی .
- روزانه ۲ بار تی زده شود (باید توجه داشت تی کشی از قسمت تمیز به سمت کثیف صورت گیرد). در بخش‌های ویژه بهتر است برای جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار جاروکشی انجام نشده و تنها تی کشیده شود.

جدا سازی و تفکیک تی های مورد استفاده در بخش ها

علت تفکیک رنگ دسته های تی:

به منظور جلوگیری از انتقال و سراحت آلدگی های محیطی با دقت و رعایت تفکیک طی ها هنگام نظافت می توان گام موثری در این زمینه برداشت.

- ✓ سفید (آبدارخانه اتاقهای اداری- اتاق پرسنل - پاوویون)
- ✓ آبی (اتاق بیماران راهرو ها - استیشن و تریتمنت)
- ✓ زرد (پاکسازی خون و ترشحات)

سطوح دیوارها:

- دیوارها و سقف نباید دارای لکه ای باشد و همیشه نظافت شوند.
- شستشو با آب و مواد پاک کننده + دستمال کشی با واپتکس ۰.۲٪ یا محلول ضد عفونی کننده مصرفی بیمارستان (در زمان واشینگها طبق برنامه تنظیمی و در هر زمان که آلودگی رخ داد)

توالت:

- روزانه : ۲ بار بطور کامل با آب و پاک کننده . همچنین اگر به وضوح و به صورت قابل رویت آلوده شوند، باید پاک گردد. جهت نظافت روتین استفاده از محلول دترجننت کافی است.
- هفتگی : شستشو با آب و پاک کننده و گندزدایی با محلول واپتکس ۰.۲٪ (۲۰-۲۵) سی سی واپتکس در ۱ لیتر آب) .
- در صورت آلوده شدن توسط بیماران با عفونت گوارشی، همان زمان شسته شده و سپس گندزدایی گردد.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

میز کار ، استیشن پرستاری و جلد دفاتر، تلفن، دستگیره دربها ، تجهیزات کامپیوتو:

- گردگیری و نظافت با دستمال تمیز و مرتوب + گندздایی با دستمال تمیز آغشته بصورت روزانه با محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان ویا الکل ۷۰ درجه
- درصورت آلوده شدن به خون و سایر ترشحات ، در حداقل زمان ممکن گندздایی انجام شود .

ترالی دارو - جا پرونده ای (Chart Plate) و پایه سرم:

- گردگیری و نظافت با دستمال تمیز و مرتوب + گندздایی با دستمال تمیز آغشته بصورت روزانه با محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان یا وایتكس٪۲
- درصورت آلوده شدن به خون و سایر ترشحات ، در حداقل زمان ممکن گندздایی انجام شود.

گوشی پژشکی:

نظافت با دستمال تمیز و گندздایی با دستمال آغشته به محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان ویا الکل ۷۰ درجه ساکشن:

پس از استفاده مخزن در سینک مخصوص تخلیه و با آب داغ و پاک کننده شسته شده و در محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور شده + آبکشی + خشک شده و به صورت تمیز نگهداری شود . سایر اتصالات را در صورت یکبار مصرف بودن ، در زباله های عفونی دفع کرده و در غیر اینصورت همانند مخزن عمل می شود .

یخچال:

- نظافت کامل با دستمال تمیز و گندздایی با دستمال تمیز آغشته به محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان بصورت روزانه و زمان آلودگی
- شستشو با آب و دترجنت + آبکشی و گندздایی با دستمال تمیز آغشته به محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان بصورت هفتگی

ونتیلاتور و کلیه متعلقات، الکتروشوک:

نظافت کامل با دستمال تمیز + گندздایی بوسیله اسپری نمودن محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان (سطوح) یا الکل ۷۰ درجه روی تمام سطوح آنها + خشک کردن با پارچه تمیز پس از گذشت زمان لازم.

رادیولوژی پورتابل:

نظافت کامل با دستمال تمیز و مرتوب+اسپری نمودن کامل آنها با محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان + خشک کردن با پارچه تمیز پس از گذشت زمان لازم.

سطلهای و بینهای بزرگ زباله:

شستشو با آب داغ و پاک کننده و گندздایی با محلول ۲۰-۲۵ سی سی وایتكس٪(۲) در لیتر آب پس از هر بار آلودگی به خون و ترشحات و نیز طبق برنامه دوره ای .(هفته ای ۲ بار)

کمد دارو- سینی دارو :

گردگیری و نظافت با دستمال تمیز و مرتوب+ گندздایی با دستمال تمیز آغشته به محلول ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان یا وایتكس٪(۲)(پس از هر بار تریق دارو و رخداد آلودگی شستشو با آب و پاک کننده)

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

مانیتور، پالس اکسی متر:

نظافت کامل با دستمال تمیز + گندزدایی بوسیله اسپری نمودن محلول سطوح(ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان) روی تمام سطوح آنها + خشک کردن با پارچه تمیز پس از گذشت زمان لازم.

لارنگوسکوپ:

- ظرف و دسته دستگاه: نظافت کامل با دستمال تمیز + گندزدایی بوسیله اسپری نمودن بر روی تمام سطوح آنها با ضدعفونی کننده مصرفی بیمارستان + خشک کردن با پارچه تمیز پس از گذشت زمان لازم .
- تیغه: شستشو با آب و درترجنت ( پاک کننده + گندزدایی بوسیله غوطه ور سازی در محلول ضدعفونی کننده مصرفی بیمارستان بمدت زمان لازم + آبکشی + خشک نمودن و نگهداری در ظرف مخصوص.

متعلقات دستگاه بخور سرد:

خالی کردن مخزن آب + شستشو با آب و پاک کننده همراه سایر قطعات+ گندزدایی با محلول ضدعفونی کننده مصرفی بیمارستان + آبکشی

آمبوبگ، ماسک و لیوان اکسیژن:

شستشو با آب و درترجنت ( پاک کننده+ گندزدایی بوسیله غوطه ور سازی در محلول ضدعفونی کننده مصرفی بیمارستان بمدت زمان لازم + آبکشی + خشک نمودن و نگهداری در مکان خشک و تمیز.

ابزار ست:

شستشو با آب و زدودن آلودگی با برس کشی کامل ابزار + غوطه ور سازی در محلول ضدعفونی کننده مصرفی بیمارستان بمدت زمان لازم + آبکشی + خشک نمودن + پک کردن ابزار + استریل نمودن در دستگاه اتوکلاو و نگهداری در محل خشک و تمیز .

ECG

نظافت کامل با دستمال تمیز + گندزدایی بوسیله اسپری نمودن محلول ضدعفونی کننده مصرفی بیمارستان یا الکل ۷۰ درجه روی تمام سطوح آنها + خشک کردن با پارچه تمیز پس از گذشت زمان لازم.

الکتروشوک:

نظافت کامل با دستمال تمیز + گندزدایی بوسیله اسپری نمودن محلول سطوح(ضدغونی کننده مصرفی بیمارستان) یا الکل ۷۰ درجه روی تمام سطوح آنها + خشک کردن با پارچه تمیز پس از گذشت زمان لازم.

### دستورالعمل استفاده از صابون مایع



در صورتی که هنگام استفاده از صابون مایع اطراف ظرف دستشویی آلوده به قطرات صابون گردید،

با استریل روزانه تمیز و صابون های اضافی پاک گردد. پس از اتمام صابون موجود در ظرف مایع، از پر کردن مجدد آن خودداری کرده و حتما پس از شستشو و خشک کردن ظرف اقدام به پر کردن آن نمایید. باقی ماندن آلودگی ها در اطراف ظروف مذبور و یا پر کردن مجدد آن بدون شستشو و خشک کردن، باعث رشد باکتری های بیمارستانی در صابون مایع می شود.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

### روش‌های مبارزه با حشرات و جوندگان

حشرات و جوندگان می‌توانند عوامل بیماری زا مانند انگل‌ها، میکروبها، ویروسها، وغیره را از راه‌های مختلف وارد بدن انسان نموده و او را به بیماری مبتلا سازند. بنابراین دانستن راه‌های مبارزه با این جانوران اهمیت زیادی در حفظ تأمین سلامت مردم دارد.

#### سوسري ها



سوسري ها بيشتر در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير زندگی می‌کنند. سوسري ها تا دماي صفر درجه را می‌توانند تحمل کنند. سوسري ها از طريق کشتبها، بسته بندبهاي مواد غذائي و همراه با اثنائيه منزل جابجا می‌شوند.

مخفيگاه های سوسري ها مجازی فاضلاب، چاه توالت، زیر زمین، انباريها، شوفاز خانه ها، هرگونه اثاث ثابت و بدون استفاده در خانه، توده زباله، توده روزنامه و یا کتاب، زباله دان، کابینت ها، کشوها، دستشویی، حمام، پشت وزیر یخچال و اجاق گاز، چاهک ها، پریزهای برق، درزها و شکاف های دیوار، سقف، کفپوش، پشت کاغذ دیواری، زیر کاشی ها، کفپوش ها و موزاییک های لق و پشت لوله های گاز و آب.

راه های ورود سوسري ها به داخل ساختمان از طريق درزها، شکاف ها و سوراخهای دیوار، سقف و زمین، در و پنجره های باز و فاقد توري، دریچه های کولر، امتداد لوله های آب و گاز، چاهک ها، لوله دودکش، دریچه های هواکش ، بسته بندی های مواد غذائي، کارتنهای حاوی مواد مختلف می‌باشد.

سوسري ها ناقلین مکانيکي ۲۲ نوع از باكتريهای، قارچ ها، انگلهاي تک ياخته و ویروسها میباشند. نظير سالمونلا، عفوتهاي روده اى نظير اسهال معمولي و خونی .سوسك ها اين ميكروبها را با قطعات دهاني، پها و فضولات خود منتقل می‌کنند.

سوسري ها ميتوانند موجب بروز آررئي و حملات آسم شوند.

سوسري ها مواد غذائي را با بزاق، برگداندن بخشی از مواد خورده شده، فضولات و ترشحات غده اى خود آلوده می‌سازند.

سوسري ها با توليد ماده اى روغنی باعث تولید بوی زننده و لکه دار شدن سطوح از جمله پارچه ها ميشوند.

#### مگس ها



مگسها اغلب با انسان معاشر بوده از انواع مواد از جمله پس مانده غذائي انسان و حيوانات ، شير، شکر ، و ميوه های فاسد ، زباله های مختلف ، اجساد در حال فساد ، مدفوع ، خون تازه و خشك شده ، خلط سينه ، ترشحات بيني و .....تغذيه مينمايند. اين مگسها از مواد آلوده تغذيه نموده و از طريق برگراندن آن مواد و مدفوع نمودن بر روی مواد غذائي و همچنین از طريق

موهای روی بدن ، عوامل بیماریزا را بطور مکانيکي منتقل مينمايند. مگس خانگی در انتقال

باكتريها مانند شيگلا ، سالمونلا ، سل و جذام و تک یافته های انگل مانند اسهال آمبي، تخم انواع کرمها، ویروسها مانند فلج اطفال و هپاتيت ها و بسياري عوامل ديگر به انسان نقش دارند.

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## موس ها



برخلاف اندازه کوچک موس ها این موجودات برای انسان بسیار خطرناک هستند و دو گونه از موشها بیشتر در محیط اطراف وجود دارند (موس خانگی و موس سقفی) . موشها به راحتی بالا رفته و با فشار خود از کوچکترین سوراخ ها رد می کنند . آنها نیاز اجباری به جویدن برای حفظ دندانهای خود دارند . وعده های غذایی نامنظم دارند . اولویت اصلی غذای این موجودات غلات است . اما تقریباً هر چیزی را می خورند . در عرض یک سال ۵-۷ بار تولید مثل می نمایند و هر بار ۱۵-۵ نوزاد به دینا می آورند . بنابراین جهت کنترل موشها و کاهش زاد و ولد و جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزad و خسارات ناشی از تعذیب آنها مبارزه با آنها الزامی است . موشها در صورت عدم دسترسی به آب در کمتر از ۳-۴ روز از بین می روند .

### اهم روشهای مبارزه با حشرات وجوندگان

استفاده از روش فیزیکی و مکانیکی :

- رعایت نظافت و شستشوی بخش
- جمع آوری خرد های نان و مواد غذائی در آشپزخانه ها و آبدارخانه ها
- نظارت بر بستن درب ظروف غذا
- بستن درب ظروف زباله ها یا کیسه های زباله، جمع آوری زباله تولیدی بصورت بهداشتی
- تعویض دربهای فرسوده و چهارچوب
- مسدود نمودن چاههای فاضلاب و دهانه آنها با توری های فلزی
- مسدود نمودن هواکش ها با توری فلزی
- نظارت بر باقی نگذاردن ظروف نشسته در آبدارخانه ها
- نصب توری بر روی پنجره ها
- ایجاد تهویه مناسب در مکانهای گرم و مرطوب مانند آشپزخانه و ...
- هرس کردن درختانی مرتبط با فضای بیرونی بیمارستان و همچنین فضای ساختمانی
- ایجاد حفاظ بر روی لوله های نصب شده روی دیوارها (ناودانها)
- توری گذاشتن کanal فاضلاب
- بهسازی حمام و دستشویی
- بندکشی در شکافهای ایجاد شده بین سنگ و کاشی و دیواها
- چیدمان مناسب انبارها و استفاده از پالت زیر و سایل انبار شده
- عدم استفاده از کارتن یا روزنامه در کف کابینتها
- تعمیر شیرها و لوله ها و جلوگیری از نشت آب و همچنین جلوگیری از جمیع شدن آب را کد

تله گذاری : به منظور مبارزه با جوندگان (موس ها) پس از بهسازی محیط و قبل از بکارگیری مواد و سوموم شیمیایی ، از روشهای مکانیکی از جمله انواع تله های زنده گیر، کشته گیر با طعمه و بدون طعمه مانند تله های چسبی (چسب موس) استفاده می شود . تله ها بیشتر در جاییکه امکان بکارگیری جونده کشها و سوموم وجود ندارد، مانند بیمارستانها روش مناسبی است .

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

استفاده از روش شیمیائی (استفاده از سموم و حشره کش‌ها):

در مبارزه با حشرات روش سمپاشی آخرین راه حل است (استفاده از سموم مجاز و مؤثراً مشورت کارشناسان مورد تأیید وزارت بهداشت

- سمپاشی اماكن مانند : اتاق بیماران ، داخل قفسه ها ، کمد لباسها ، ابدارخانه ها ، ظروف زباله ، چاههای فاضلاب توسط شرکت سمپاشی در طول سال (فصلی) و بر حسب ضرورت انجام می گیرد.
- قبل از سم پاشی باید کلیه بخشها و مکانهایی که سم پاشی می گردد شسته شوند.
- در هنگام سمپاشی کلیه ظروف و مواد غذائی می بایست توسط نیروهای خدماتی از قفسه ها خارج شوند و روی آنها پوشانده شود..
- در هنگام سمپاشی بخش می بایست عاری از بیمار باشد. که سرپرستار بخش هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام می دهد.
- بعداز سم پاشی تا ۴۸ ساعت مکانهای سم پاشی شده نباید شسته شوند.

### استفاده از روش های بیولوژیکی:

در این روش با استفاده از موجودات زنده و دشمنان طبیعی نسبت به کاهش حشرات اقدام می شود (در بیمارستان ها کاربرد ندارد).

استفاده از روش تلفیقی : چون هیچیک از روش های مبارزه با حشرات تنها ی کافی نیست لذا بهترین روش ، استفاده از روش تلفیقی است که در آن بر حسب مورد از ۱ یا چند روش باهم استفاده می شود. آنچه که مهم است بهترین روش، استفاده از امکانات و توانمندیهای موجود در منطقه علیه ناقلين همان منطقه می باشد.

### مدیریت پسماندهای بیمارستانی

از آنجاییکه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی بارعايت ضوابط و استانداردها درخصوص بهداشت محیط به صورت عام و جمع آوري ودفع بهداشتی پسماندهابه صورت خاص، همگام با مدیریت صحیح آنها، افزایش اثربخشی و کارآیی خدمات بیمارستانی و حفظ صیانت از سلامت پرسنل، بیماران و محیط زیست رابه همراه خواهند داشت. بنابراین آشنایی با ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته ضروری می باشد همچنین مدیریت زباله های خطرناک بخش جدایی ناپذیر بهداشت بیمارستان و کنترل عفونت است که درصورت عدم رسیدگی مناسب می تواند از طریق تماس مستقیم به وسیله ناقلين یا از راه هوا به دیگران منتقل شود.

بیمارستانها و مراکز درمانی مهم ترین مراکز تولید زباله های بیمارستانی هستند. مدیریت مواد زائد بهداشتی درمانی شامل تولید، ذخیره، محل جمع آوری، حمل و نقل ، پردازش و دفع می باشد. جلوگیری از تولید مواد زائد و مراقبت های بعد از دفع و تصفیه مقدماتی ، از ویژگی های مدیریت مواد زائد بهداشتی درمانی است که به دلیل مخاطره آمیز بودن این مواد ، در این سیستم های مدیریتی مورد تاکید قرار گرفته است.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

### ❖ تفکیک (مرحله اول)

#### تعريف زباله بیمارستانی:

به کلیه مواد زاید جامد و نیمه جامد تولیدی از تمام بخش ها و واحدهای درمانی و غیردرمانی یک بیمارستان زباله بیمارستانی اطلاق می شود. این زباله ها بیمارستانی به چهار دسته تقسیم می شود:

#### ۱- زباله های معمولی یا شبه خانگی:

به زباله هایی اطلاق می گردد که از لحاظ حمل و نقل مشکل خاصی ندارند. ماتنند زباله های قسمت اداری، آشپزخانه، آبدارخانه، پسماندهای تولیدی توسط عیادت کنندگان، مراجعین و پرسنل تولید می گردد. که باید در سطل آبی با پلاستیک مشکی ریخته شود.

#### ۲- زباله های عفونی و خطرناک:

به زباله هایی اطلاق می گردد که می تواند حداقل یک بیماری عفونی را منتقل کند، ماتنند زباله های اتاق عمل، بخش های زایمان، اورژانس، اتاق پانسمان، دیالیز، بانک خون، داروهای تاریخ گذشته و ته مانده، ICU، تزریقات، آزمایشگاههای داروها و مواد شیمیایی و به طور کلی تمام پارچه ها و البسه آلوده به خون، گاز و پنبه مصرف شده برای پانسمان، نمونه های آزمایشگاهی و محیط های کشت مربوطه، اقلام پلاستیکی ماتنند سوند، کیسه ادرار، سرنگ، درن و ... که باید در سطل زرد با پلاستیک زرد ریخته شود.

#### ۳- زباله های تیز و برنده :

سوزنهاي زيرپوستي، آزشيوكت، تيغ بيستوري، اسكالپ، لانست، پيبت شکسته، آمپول، سوزن سرنگ، چاقوقوتieux جراحی، سايراشبيا شکسته شيشه اي و برنده..... که باید در سفتی باكس ریخته شود.

#### ۴- زباله های شيميايی و دارويي :

کلیه داروهای اضافی و تاریخ مصرف گذشته، بطری و جعبه داروکه در صورت رهاسازی در محیط برای انسان مضرمی باشد- مواد شیمیایی دوریزمانندگندزادهای تاریخ مصرف گذشته، حلالها و معرفهای آزمایشگاهی ..... که باید در سطل سفید یا قهوه ای با پلاستیک سفید یا قهوه ای ریخته شود.

### ❖ جمع آوری (مرحله دوم) در هنگام جمع آوری رعایت نکات زیر الزامی است:

- در صورت عدم وجود کیسه زباله مقاوم از دو کیسه همنگ داخل یکدیگر استفاده شود.
- بايستی برچسب گذاری (دارای مشخصات نام بخش و نوع زباله، تاریخ جمع آوری ) قبل از جمع آوری زباله انجام شود.
- درب کیسه ها بعد از پر شدن بسته شود.
- از فشردن کیسه های زباله جهت کاهش حجم اکیدا خودداری شود
- قبل از انداختن بگ های ادراری Urine Bags چست باتل ها Chest Bottle، به داخل سطل های زباله به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و کاهش حجم ، مایعات داخل آن ها در جایگاه مخصوص تخلیه گردد.
- در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماندهای عفونی، شیمیایی، رادیواکتیو و نظایر آن خارج کردن آن ممنوع است.


## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- ۷- اعضا و اندامهای قطع شده بدن و جنین مرده طبق احکام شرع جمع آوری و تفکیک گردد.
- ۸- مایعات، محصولات خونی و سیالات بدن نباید در کیسه‌های پلاستیکی ریخته و حمل شوند مگر آنکه در ظروف یا کیسه‌های مخصوص باشند.
- ۹- با توجه به آلودگیهای نان‌های خشک تولیدی در بیمارستانها و همچنین ایجاد آلودگیهای ثانویه، بازیافت نان خشک ممنوع بوده و به همراه زباله‌های معمولی دفع گردد (جز نانهای خشک اتاق بیماران عفونی که زباله عفونی محسوب می‌شود)

- هرگز از کیسه‌های پلاستیکی برای جمع آوری و نگهداری پسماندهای تیز و برنده استفاده نکنید و هرگز سر سوزن‌ها را داخل سطل‌های زباله نندازید.
- به منظور خطرات احتمالی و جلوگیری از آن از نصب هرگونه سیفتی باکس در داخل اتاق بیماران و راهروها جداخودداری شود.
- پس از بستن درب سفتی باکس، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود.

برچسب گذاری:

برچسب گذاری باید دارای ویژگیهای زیر باشد:



- ❖ کیسه‌ها یا ظروف حاوی پسماند باید بر چسب گذاری شوند.
- ❖ هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود.
- ❖ برچسب‌ها با اندازه قابل خواندن باید بر روی ظرف یا کیسه چسبانده و یا به صورت چاپی درج شوند.
- ❖ برچسب در اثر تماس یا حمل، نباید به آسانی جدا یا پاک شود.
- ❖ برچسب باید از هر طرف قابل مشاهد باشد.



- ❖ انتقال (مرحله سوم) در هنگام انتقال رعایت نکات زیر الزامی است:
  - بایدهمه کیسه‌های پسماندها سربسته و دست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند.
  - تعویض گاری چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است.
  - ارسیستم پرتاپ برای انتقال زباله به محل نگهداری استفاده نشود.
  - حمل پسماندهای گونه‌ای انجام شود که کیسه‌ها دچار پارگی، شکستگی و بیرون ریزی پسماند نشوند.
  - پسماندها نباید در بخش‌های باقی بماندو بايدللافاصله پس از جمع آوری به محل نگهداری موقت انتقال داده شوند.
  - کلیه کارگران در زمان جمع آوری پسماندهای باید از دستکش، ماسک و لباس مخصوص استفاده نمایند.
  - گاریهای حمل زباله قبل از بازگشت به بخش می‌بایست شستشو و ضدعفونی شوند.
- برای حمل دستی کیسه‌های پسماند باید قسمت بالایی آن در دست گرفته شود و پس از حمل با احتیاط و آهسته بصورت عمودی بر روی زمین قرار گیرد تا در صورت لزو م برای حمل دستی مجدد آن مشکلی ایجاد نشود.

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

- در زمان حمل دستی کیسه پسماند، حداکثر دو کیسه حمل گردد و فرد حامل دقت نماید که کیسه پسماند با بدنش تماس نیابد.
- برای حمل ظروف نگهداری پسماند نوک تیز و برنده باید از دستگیره آن استفاده شود و دست دیگر در زیر آن قرار نگیرد (ممانتع از جراحت در صورت سوراخ شدگی احتمالی).
- از سطوح شیبدار نباید برای انتقال و جایه‌جایی پسماندهای عفونی استفاده نمود.
- زمانهای حمل زباله نباید با ساعات شلوغی کار، ملاقات و توزیع غذا تداخل داشته باشند، زمانهای حمل مواد پسماندهای عفونی وغیر عفونی باید متفاوت باشد.

### ❖ دفع زباله (مرحله چهارم)

اصولاً" بر طبق دستورالعمل (( ضوابط وروشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی وپسماندهای وابسته )) وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می بایست پس از جمع آوری انتقال زباله های عفونی از بخش ها و انتقال آن به جایگاه نگهداری موقت پسماند، زباله های عفونی توسط اتوکلاوهای موجود در بیمارستان عمل امحاء (بی خطر سازی) انجام شود و سپس تحويل شهرداری گردد.



#### رختشویخانه

عدم رعایت موازین بهداشتی در رختشویخانه یکی از نگرانی های عمدۀ در بیمارستانها است.

رختشویخانه از بخش های مهم بیمارستان بوده که از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. در اهمیت واحد رختشویخانه همین بس که توصیه می شود در هنگام بازدید از بیمارستان ابتدا به بخش اورژانس و اتاق، ICU، CCU، رفته و در دومین مرحله به سراغ رختشویخانه و در نهایت به مراکز استریلیزاسیون عمل بروید.

جريان کار:

وظیفه کلی: شست وشوى لباس بیماران، البسه مورد استفاده در اتاق عمل، پتو، شستن لباس پرسنل و...  
مراحل انجام کار: شستن لباس، خشک کردن، اتو کردن و فرستادن به .CSR

تعاریف:

**البسه کثیف(غیر عفونی)**: البسه مصرف شده که مدت زمان زیادی از مصرف آن نگذشته باشد و باقیستی هرچه زودتر شست و گندздایی گرددند.

**البسه آلوده (عفونی)**: که به علت تماس با عفونت آلوده شده است.  
طبقه بندی و تفکیک ملحفه های آلوده قبل از بازگیری در واحد شستشو الزامی است . طبقه بندی ملحفه ها قبل از شستشو هم ماشین و هم ملحفه ها را از اثرات اشیاء در ملحفه ها حفظ می کندو پتانسیل آلودگی مجدد ملحفه های تمیز را کاهش می دهد.

## **کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط**

طبقه بندی و تفکیک پس از شستشو موافقه مستقیم کارگاه رختشویخانه را با مواد عفونی به حداقل می رساند و آلودگی هوا بر میکروبی در رختشویخانه را کاهش می دهد.

### **دستور العمل تفکیک و جمع آوری البسه کثیف و آلوده**

- بهترین زمان تعویض ملحفه ها صبحگاه بعد از خوردن صبحانه و قبل از ویزیت پزشکان است.
- پرسنل خدماتی برای جلوگیری از آلودگی هوا، به هنگام جمع آوری و تفکیک ملحفه و البسه باید آرامش کامل داشته باشند و از شتاب زدگی اجتناب نمایند.
- در مراحل مختلف تفکیک و شستشوی البسه از وسایل حفاظت فردی (مانند ماسک، دستکش و گان محافظ) استفاده شود. لزت کثیف توسط پرسنل خدماتی در کیسه مشکی رنگ و داخل بین کثیف قرار داده می شود و با چسباندن برچسب مشخص نام بخش پرسنل لزت به جمع آوری کیسه های حاوی لزت کثیف اقدام می نمایند، به هنگام تحويل گرفتن لزت از عدم باقی ماندن وسایلی مانند سوزن، اشیای نوک تیز و برنده ... در داخل ملحفه ها اطمینان حاصل شود؛ چراکه در غیر این صورت خطر انتقال عفونت های منتقله از راه خون مانند هپاتیت B و ایدز برای پرسنل لزت وجود خواهد داشت.
- در صورت آلوده بودن ملحفه ها و البسه باید از وسایل حفاظت کننده (دستکش، گان) استفاده شود یا با تازدن یا پیچیدن ملحفه می توان قسمت آلوده را در وسط ملحفه محفوظ نگه داشت.
- لزت عفونی توسط پرسنل بخش در کیسه زرد رنگ قرار داده می شود به طور مطمئن و کامل گره زده می شود و برچسب مشخصات شامل نام بخش و عفونی بودن بر روی آن چسبانیده و داخل بین کثیف قرار داده می شود.
- در لندری کلیه لباس ها تفکیک می شود و لباس های خونی و عفونی و لباسهای کثیف از هم جدا شده و در بین های مخصوص ریخته می شود و در دستگاه شستشوی مخصوص خود با مواد شوینده و ضد عفونی کننده ریخته می شود.
- کیسه های جمع آوری ملحفه و البسه باید مانع از نشت و نفوذ رطوبت باشد و در جای مرطوب نگهداری نشوند.
- تفکیک در شستشوی رخت کثیف عفونی و رخت کثیف غیر عفونی، اصلی مهم در کنترل عفونت های بیمارستانی است.

### **دستور العمل شستشوی البسه بیماران(آلوده - کثیف) و پرسنل**

پرسنل ابتدا باید از وسایل حفاظت فردی مانند لباس مناسب ، چکمه ، ماسک و دستکش استفاده نمایند. البسه الوده (ماشین لباسشویی عفونی) والبسه کثیف (ماشین لباسشویی غیر عفونی) والبسه پرسنل (ماشین لباسشویی ویژه پرسنل) باید هر کدام بصورت جداگانه شسته شود. سه مرحله شستشو برای البسه و ملحفه های آلوده عبارت است از:

#### **مرحله اول:**

- در این مرحله بعلت وجود ملحفه والبسه های خونی شستشو با آب سرد انجام شود.

# کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

## مرحله دوم:

- شستشو با استفاده از مواد پاک کننده و آب داغ با درجه حرارت  $C \geq 71$  برای مدت ۲۵ دقیقه همراه با مصرف مواد شیمیایی (وایتكس خانگی) توصیه می شود این امر باعث کاهش تعداد باکتریها می شود.


## مرحله سوم:

- مرحله پایانی و آبکشی می باشد که می توان از نرم کننده ها استفاده کرد.

### مقدار استفاده از مواد شیمیایی در ماشین های لباس شویی رختشویخانه

وایتكس خانگی (۵/۲۵)	درصد استفاده	نوع البسه
در ۱۰۰ لیتر آب	%۱	البسه کشیف
۱ لیتر	%۲	البسه الوده
۲ لیتر	%۲/۵ - ۳	همراه با لخته های خون زیاد (بلوک زایمان و اتاق عمل)
۳ لیتر		

## بهداشت مواد غذایی



یکی از اجزاء مهم ارائه خدمات در بیمارستان اطمینان از ایمنی و سالم بودن غذاست. اقدامات نامناسب برای تهیه و توزیع غذا باعث آلودگی و بقاء و رشد باکتریهای عامل عفونت می گردد. بیماریهای منتقله توسط غذا مخصوصاً در بیماران دارای نقص ایمنی مهم شایع ترین اشکالاتی هستند که باعث بروز مسمومیت غذایی می شوند.

### ۲ فاکتور مهم در پیشگیری از بیماریهای باکتریایی ناشی از غذا:

- نگهداری غذا در دمای مناسب (در حدود بالای ۶۰ درجه و یا زیر ۵ درجه سانتیگراد)
  - ❖ چنانچه غذای تهیه شده در فاصله زمانی مناسب (از طبخ تا مصرف) به دست بیمار (صرف کننده) نرسد و در طول مسیر در دمای مناسبی نگهداری نشود احتمال آلودگی آن به میکرووارگانیزمها بیماریزا بیشتر خواهد شد.
  - ❖ مواد غذایی پخته شده در دمای اتاق پس از گذشت ۴ ساعت مقدار لازم از سم جهت ایجاد مسمومیت تولید می نمایند.
- پرهیز از آلودگی ثانویه غذایی پخته شده بوسیله غذای خام یا کارکنان
  - ❖ تمیز و ضد عفونی کردن کلیه سطوح و وسایل مورد تماس با غذای پخته شده
  - ❖ شستشوی مرتب دستها پس از انجام فعالیت خصوصاً "بعد از استفاده از توالت"

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

❖ عدم نگهداری باقیمانده غذاها در یخچال بخشها

❖ عدم فعالیت پرسنل خدمات و کمکی بخشها در توزیع غذای بیمار

❖ جمع آوری به موقع زباله و نگهداری دور از دسترس حشرات و جوندگان

به طور خلاصه اصول کلی در تهیه و پخت و نگهداری مواد غذایی به شرح زیر میباشند:

۱- نگهداری غذا در دمای مناسب بالای  $5^{\circ}C$  یا زیر  $60^{\circ}C$

۲- پرهیز از آلودگی ثانویه بوسیله مواد غذایی خام یا پرسنل بیمار

۳- تمیز و ضد عفونی کردن کلیه سطوح وسایل و ظروف برای آماده سازی غذا

۴- خروج سریع غذاهای فاسد شدنی و دور ریختنی و نظافت ظروف محتوى آنها

۵- طراحی دقیق و عملی نقشه آشپزخانه و تجهیزات آن برای افزایش سرعت فرایند و آماده سازی غذا

۶- بسته بندی پس مانده های آشپزخانه در کیسه های زباله و نگهداری آنها دوراز دسترس حشرات و جوندگان.

۷- جداسازی محل و وسائل آماده سازی غذاهای خام از پخته

۸- استفاده از ظرفشویی و وسایل مناسب جهت شستشو

۹- دسترسی به مواد شوینده و ضد عفونی کننده مناسب

۱۰- استفاده از ظرفهای مناسب جهت نگهداری مواد غذایی در فریزر و یخچال

۱۱- استفاده از تراالی گرمکن دار با دماستج های استاندارد

۱۲- استفاده از تخم مرغ و شیر پاستوریزه جهت بیماران گاواظی و یا دارای رژیم پوره، نظافت مستمر مخلوط کن و سایر وسایل

موردن استفاده در تهیه غذای بیماران گاواظی

۱۳- کنترل سلامت و بهداشت کارکنان واحد تغذیه

الف- نظارت بر ضد عفونی دستهای کارکنان به طور مستمر

ب- تأمین مایع صابون و پاک کننده مناسب برای دستشویی

ج- کشت های مدفعی متناوب و دوره ای از کارکنان

د- آموزش مستمر کارکنان تهیه و توزیع غذا (WHO, 1996)

منابع:

۱- معصومی اصل سلیمانی،حسین . راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، انتشارات چکامه آوا ، تهران، ۱۳۸۵

۲- معصومی اصل سلیمانی،حسین و افهمی،شیرین .بیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی.انتشارات تیمورزاده ، تهران ، ۱۳۷۹

۳- وطن دوست،حسن . شناخت سوسنی ها و کنترل انها.انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹

۴- موسوی ، سید احمد.مدیریت مراکز استریلیزاسیون و لندری و مواد زاید بیمارستانی.انتشارات خسروی،تهران، ۱۳۸۰

۵- دهقانی، محمد هادی.راهنمای بهداشت محیط بیمارستان.انتشارات نخل، تهران ، ۱۳۸۱

۶- آئین نامه ها و بخشنامه های مرکز سلامت و محیط کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- اینترنت

ضمایم و دستورالعمل ها :



### دستور العمل استفاده بهداشتی از تی

## کدبندی رنگی

استفاده از سه کد رنگی برای تی کشی قسمتهای مختلف الزامیست

برچسب سفید

برچسب زرد

برچسب آبی

تی کشی قسمتهای اداری  
اتفاق پرسنل  
پاویون و کلاسهاي درس

پاکسازی خون و  
ترشحات

تی کشی اتفاق بیمار  
راهروهای بخش  
تریتمت، استیشن

برچسب رنگی روی دسته تی نصب می شود

### نحوه شستشو و گندزدایی تی:

مرحله اول: بعد از اتمام نظافت، شستشوی تی با آب و تاید و آبکشی.

مرحله دوم: به مدت ۱۵ دقیقه در محلول وايتکس ۲۰٪ (۲۰ سی سی وايتکس در یک لیتر آب) قرار گرفته تا گندزدایی گردد.

مرحله سوم: پس از گندزدایی آبکشی شده و بمنظور جلوگیری از رشد میکروبها، انتشار بوی نامطبوع و خشک شدن، تی در محل مناسب آویزان گردد.

توجه: هر ۱۵ روز یکبار نخ تی تعویض شده و تاریخ تعویض نخ روی دسته تی با برچسب مشخص گردد.

وجود هر نوع زنگ زدگی در قسمتهای مختلف تی نشانه زمان تعویض تی بخش می باشد.  
استفاده از تی زنگ زده جهت نظافت بخش ممنوع است

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

دستورالعمل نحوه استفاده از محلولهای گندزدا و ضدعفونی کننده در بخشها و واحدهای بیمارستان کامکار- عرب نیا

ردیف	نام محلول	محل استفاده	کاربرد (مورد استفاده)	درصد لازم	سطح گندزدا یی	زمان تماس	نحوه نگهداری	ماندگاری
۱	آب ژاول (وایتكس)	کلیه بخشها و واحدها	کلیه سطوح تماس (کف زمین/ سرویس بهداشتی/ حمام / تی نظافت سینکها/ سطل زباله/ لگن/ تخت بیمار و ..)	۲٪	متوسط تا سطح بالا	۱ دقیقه	در ظروف در بسته، دور از آفتاب و در دمای اتاق ۲۵ درجه	۲۴ ساعت بعد از رقیق سازی
۲	پروکسان	دیالیز	جهت گندزدایی دستگاه دیالیز	آماده مصرف	سطح بالا	۱ دقیقه	دور از نور و در دمای ۲۵ درجه	۱۸ ماه طبق تاریخ درج شده
۳	میکروزد آی دی مکس	بخشها	ضد عفونی کننده ابزار است	۲٪	متوسط	۱۵ دقیقه	در ظروف در بسته، دور از آفتاب و در دمای اتاق	۱۰ روز بعد از رقیق سازی
۴	میکروزد اولترا	اتاق عمل	ضد عفونی کننده ابزار است (نیمه بحرانی)	٪۵	سطح بالا	۱۵ تا ۲۰ دقیقه	در ظروف در بسته، دور از آفتاب و در دمای اتاق	۱۰ روز بعد از رقیق سازی
۵	اسپری نانوسیل D2	کلیه بخشها	سطوح/ دربها /میز کار/ ترالی/ اتجهیزات تخت بیمار- میز بیمار	آماده مصرف	متوسط	۱۵ دقیقه	در ظروف در بسته، دور از آفتاب و در دمای اتاق	۲ سال طبق تاریخ درج شده
۶	الکل اسپری میکروزد پرپ	کلیه بخشها	جهت ضد عفونی پوست قبل از تزریق	آماده مصرف	متوسط	-	دارای برچسب تاریخ	طبق تاریخ درج شده
۷	مایع الکلی دست	کلیه بخشها	هندراب دستها	آماده مصرف	(کاهش میزان میکروب)	۳۰ ثانیه	دور از حرارت و نور خورشید	طبق تاریخ درج شده

## کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط

			های مضر)				درموسپ ت	
طبق تاریخ درج شده	در ظروف دربدار	بعد از تماس	متوسط	آماده مصرف	ضد عفونی زخم (سبز - (اسکراب جراحی (قهوه ای))	کلیه بخشها	بتادین	۸
۱۴ روز بعد از فعال سازی	در ظروف در بسته	گندزدا یی ا دقی قه - استریا یزاسیو ن ۱۰ ساعت	سطح بالا	+ محلول + ماده فعال کننده نیتریت سدیم	ضد عفونی ابزار و لوازم پزشکی	آندوسکوبی آندوسکوبی گلوتارالدیید ۲٪.	سایدکس	۹
۲ سال طبق تاریخ درج شده	در ظروف در بسته، دور از آفتاب و در دماه ۳۰ درجه	۱۵ دقیقه	سطح بالا	۲٪. (۲۰ سی سی در ۱ لیتر آب)	سطح محیطی مانند کف زمین... و سرویس‌های بهداشتی	کلیه بخشها	سورفامد	۱۰

## دستورالعمل تفکیک و جمع آوری زباله ها در بخش های بیمارستان کامکار - عرب نیا

زباله های آبدارخانه، اداری، ایستگاه پرستاری، قوطی کشته ره، بطری و ظروف پکار مصرف، باقیمانده غذا و نان (بیمار غیر عفونی) پسماند کاغذی در ظروف مخصوص بازیافت کاغذ مدیریت پسماند شهرداری



### زباله غیر عفونی



گاز- باند، نخ پخته استفاده شده، ست سرم بجز سوزن، خون و مایعات بدن، نمونه های آزمایشگاهی و محیط های کشت میکروبی، کلیه پسماندهای ایزوله و بخش عفونی، اقلام پلاستیکی سوندوکیسه اداره کیسه های خون مصرف شده یا تاریخ مصرف گذشته و ....

### زباله عفونی



کلیه داروهای اضافی و تاریخ مصرف گذشته، بطری و جعبه دارو که در صورت رها سازی در محیط برای انسان مضر می باشد- موارد شیمیایی دوریزماندگیزدahای تاریخ مصرف گذشته، حلالها و مرغهای آزمایشگاهی و ....

### زباله دارویی و شیمیایی



سوزنهای زیبریوستی، آنزیوکت، تیغ بیستوری، اسکالپ، لانست، پیپت شکسته، آمپول، سوزن سرنگ، چاقو تیغ جراحی، سایر اشیاءی شکسته شیشه ای و برند و ....

### زباله تیزو برند

